



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agentury

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena Kolouchová/545 110 477

E-MAIL: alena.kolouchova@srs.cz

DATUM: 19.1.2011

VERDICT 25 WG – rozsah registrovaného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	LA	3) Poznámka
kukuřice setá mimo kukuřice cukrová	plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé	60 g/ha 200-300 l vody /ha + 0,1 % TREND 90 - TM nebo 2 x 30 g/ha 200-300 l vody /ha + 0,1 % TREND 90 - TM	AT	-	1) od: 11 BBCH, do: 17 BBCH 2) od: 13 BBCH, do: 15 BBCH - plevle jednoděložné, od: 12 BBCH, do: 14 BBCH - plevle dvouděložné 3) max. 2 x při dělené aplikaci
brambor	plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé	60 g/ha 200-300 l vody /ha + 0,1 % TREND 90 - TM nebo 2 x 30 g/ha 200-300 l vody /ha + 0,1 % TREND 90 - TM	AT	-	1) postemergentně před zapojením porostu, výška porostu 5 cm 2) od: 13 BBCH, do: 15 BBCH - plevle jednoleté, od: 12 BBCH, do: 14 BBCH - plevle dvouděložné 3) max. 2 x při dělené aplikaci

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi poslední aplikací a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Plevle citlivé:

jednoděložné jednoleté a vytrvalé - pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry

dvouděložné jednoleté a vytrvalé - pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přitula, heřmánkovité plevle, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pětour malolobný, ředkev ohnice, řepení, mléč rolní, výdrol slunečnice

Plevle méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý

Růstová fáze plodin v době ošetření:

kukuřice – 1.-7. list, tj. BBCH 11-17

brambor – postemergentně, před zapojením porostu – výška porostu 5 cm

Růstové fáze plevelů: plevelé musí být postřikem zasaženy

jednoděložné – 3-5 listů, tj. BBCH 13-15

dvouděložné – 2-4 pravé listy, tj. BBCH 12-14

Maximální počet aplikací: aplikace jednorázová – max. 1x nebo dělená – max. 2x

Dávka vody: 200-300 l/ha

Přípravek VERDICT 25 WG je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem TREND 90, v souladu s návody na jejich použití.

S pomocným prostředkem TREND 90 vykazuje přípravek zvýšenou pěnivost.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek VERDICT 25 WG může vyvolávat zpravidla přechodné příznaky fyto toxicity např. chlorózy, deformace nebo růstové změny.

Citlivost odrůd ošetřované plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace!

VERDICT 25 WG nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem (extrémní teploty, zamokření)

ani na půdách s obsahem organické hmoty <0.5 % a >10 %.

Nepoužívejte VERDICT 25 WG v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci ošetřena systémovými insekticidy na bázi organofosfátů.

V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů aplikací na list, může být VERDICT 25 WG použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci herbicidu VERDICT 25 WG.

Neošetřujte v době maximálních denních teplot. Ošetřujte při teplotě 10-25 °C.

Citlivé odrůdy kukuřic mohou být poškozeny, jestliže noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu.

VERDICT 25 WG se nedoporučuje aplikovat v době, kdy během 24 hodin dochází k poklesu teplot z 30°C pod 5°C.

Neošetřujte hybridy *Ceran 195*, *Furio*, *Felicia*, *Janna*, *Noella*, *Optima*, *Pactol* a *Tina* ani odrůdu brambor „*Salome*“.

Pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání kukuřice nebo brambor je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a brambor!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku
VERDICT 25 WG.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru
od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.