



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení koordinace hodnocení

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON V. FRIDRICHOVÁ /545 110 474

E-MAIL: vera.fridrichova@srs.cz

DATUM: 13.06.2011

ACCENT 75 WG – rozsah registrovaného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	LA	3) Poznámka
kukuřice setá	ježatka kuří noha, plevle dvouděložné jednoleté	50 g/ha 200-400 l vody/ha + TREND 90 0,1 % (TM)	AT	--	1) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH 3) max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Nepoužívejte ACCENT 75 WG v cukrové nebo osivové kukuřici: některé linie mohou vykazovat nedostatečnou toleranci. Konzultujte citlivost odrůdy s dodavatelem osiva.

Spektrum účinnosti:

Plevle citlivé: pýr plazivý, ježatka kuří noha, zemědým lékařský, konopice širokolistá, svízel přitula, hluchavka nachová, rdesno červivec, ptačinec žabinec, penízek rolní, laskavec ohnutý, heřmánkovité plevle, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, violka rolní

Plevle méně citlivé: merlík bílý; potlačuje pcháč oset

Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 1x

Růstová fáze plodiny v době ošetření: BBCH 12-16, tj. 2-6 listů

Růstová fáze plevelů:

jednoděložné – BBCH 13-15 tj. 3-5 listů

dvouděložné – BBCH 12-14 tj. 2-4 pravé listy; pcháč oset BBCH 30 tj. ve fázi listové růžice

Déšť do 4 hodin po ošetření kukuřice přípravkem ACCENT 75 WG může redukovat výsledný účinek ošetření.

Neošetřujte kukuřici, která byla v době výsevu nebo kultivace ošetřená organofosfátovými insekticidy (terbufos)! Citlivost odrůdy konzultujte s dodavatelem osiva.

Pokud byly organofosfátové insekticidy použity na list, aplikujte ACCENT 75 WG nejdříve za 7 dní po jejich aplikaci.

Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci ACCENTU 75 WG.

Ošetřujte při teplotách 10-25 °C!

Citlivé hybridy kukuřice mohou být poškozené, pokud noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu. Ošetření prováděná během nebo bezprostředně po období vysokých rozdílů mezi nočními a denními teplotami mohou rovněž snížit herbicidní účinek.

ACCENT 75 WG nelze kombinovat s přípravky na bázi 2.4-D.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Pozor na odrůdy kukuřice citlivé na účinnou látku nicosulfuron!

ACCENT 75 WG je rychle odbouráván v prohrátých, kyselých a mikrobiálně aktivních půdách. Vzhledem ke krátkému reziduálnímu působení v půdě je v roce aplikace většinou

možné pěstovat jakoukoli ozimou obilninu bez omezení. Ozimé obilniny lze zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné zařadit pouze kukuřici nebo sóju (minimální interval 15 dní). Za nepříznivých povětrnostních podmínek pro odbourávání přípravku může dojít k poškození následných kultur, zvláště ozimých obilnin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice seté!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je nutné použít v tank-mix směsi se smáčedlem TREND 90 0,1 % v souladu s návody na jejich použití.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných aplikačním zařízením, v němž byl přípravek na bázi úč.l. nicosulfuron, musí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.
- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku (např. All Clear Extra®), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.
- Trysky a sítko čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem (např. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.
- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na obdělávané půdě ani v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Accent 75 WG	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice	4	4	4	4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
---	--	--	--	--

Kukuřice	3	3	3	3
----------	---	---	---	---

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.