



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

## **Státní rostlinolékařská správa**

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení koordinace hodnocení

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Boušková /545 110 407

E-MAIL: eva.bouskova@srs.cz

DATUM: 20.9. 2011

### **Reactor 360 CS – rozsah registrovaného použití přípravku**

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití    | Dávkování, mísitelnost       | OL | LA | 3) Poznámka                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----|----|---------------------------------------------------|
| brambor                    | svízel přitula, plevle dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha 300-400 l vody /ha | AT | -  | 1) po slepé proorávce<br>3) max. 1x               |
| řepka olejka ozim          | svízel přitula, plevle dvouděložné jednoleté | 0,25 l/ha 300-400 l vody /ha | AT | -  | 1) preemergentně do 3 dnů po zasetí<br>3) max. 1x |

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

#### **Spektrum účinnosti:**

**Plevle citlivé:** svízel přitula, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, peníze rolní

#### **Růstová fáze plodin v době ošetření:**

- řepka olejka – preemergentně do 3 dnů po zasetí
- brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musí být pod povrchem půdy

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.

Na písčitéch půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Reactor 360 CS.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.