



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení koordinace hodnocení

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407

E-MAIL: eva.bouskova@srs.cz

DATUM: 17. 4. 2013

MILAGRO 240 SC – rozsah registrovaného použití

1) Plodina, Oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	LA	3) Poznámka
kukuřice setá	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	0,17 l/ha	AT	-	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Spektrum účinnosti:

plevele citlivé: ježatka kuří noha, svízel přitula, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, řepka olejka výdrol
plevele méně citlivé: pýr plazivý, merlík bílý

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14-16, tj. 4-6 listů

Růstová fáze plevelů:

ježatka kuří noha – do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

pýr plazivý – BBCH 13-14, tj. 3-4 listy,

plevele dvouděložné jednoleté – BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1x v plodině

Dávka vody: 200-300 l/ha

Po ošetření plodiny nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fyto toxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Následné plodiny:

Ozimé obilniny lze po orbě zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny:

V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě pěstovat kukuřici. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonamidy, triazolopyrimidiny, triazolinu) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

MILAGRO 240 SC	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Kukuřice	5	0	0	0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.