



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407
E-MAIL: eva.bouskova@ukzuz.cz

DATUM: 3. 2. 2014

Adexar – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, Oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice	braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, helmintosporiíza pšenice, padlí travní, rez plevová, rez pšeničná, stéblolam	2 l/ha	35	
ječmen	rynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, ramulariová skvrnitost ječmene, rez ječná	2 l/ha	35	
tritikale	braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez žitná, padlí travní, stéblolam	2 l/ha	35	
žito	rynchosporiová skvrnitost ječmene, rez žitná, padlí travní	2 l/ha	35	

Přípravek se aplikuje postřikem.

Dávka vody: 100-400 l/ha

Max. počet ošetření v plodině: 2x v intervalu 21 dní (proti stéblolamu max. 1x)

Termín aplikace: na počátku infekce (pšenice, žito, tritikale v BBCH 25-69, ječmen v BBCH 25-61)

Při aplikaci v ječmeni v BBCH 32-61 přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti nespecifickým skvrnám na listech.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu carboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, fluxapyroxad, oxycarboxin) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Pšenice, ječmen, žito, tritikale	4	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až za dva dny po aplikaci.

Předpoklad je, že postřiková kapalina na rostlinách je zcela zaschlá při vstupu pracovníků!