



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,

organizační složka státu

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407

E-MAIL: eva.bouskova@ukzuz.cz

DATUM: 23. 6. 2014

Kelvin 4 OD – rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
kukuřice setá mimo kukuřice cukrová	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	1 l/ha 300 l vody /ha	AT	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé:

ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, peníze rolní

Plevele méně citlivé: violka rolní, pýr plazivý, merlík bílý

Růstové fáze plodiny v době aplikace:

BBCH 14-17, tj. 4-7 listů

Růstové fáze plevelů:

ježatka kuří noha – do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

pýr plazivý – BBCH 13-14, tj. 3-4 listy,

plevele dvouděložné – BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1x v plodině

Děšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fyto toxicity – chloróza a deformace listů, zpomalení růstu a vývoje rostlin.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem povolení!

Následné plodiny

Ozimé obilniny lze zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny

V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné zařadit pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
kukuřice	5	0	0	0

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.