



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Karla Pallichová Vymětalová/545 110 443

E-MAIL: karla.pallichova-vymetalova@ukzuz.cz

DATUM: 18. 8. 2014

Opus Top – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice, ječmen	padlí travní, rzi	1 l/ha	35	
cukrovka	cerkosporióza řepy	1 l/ha	42	

Aplikační dávka vody: 200-400 l/ha

Počet aplikací: max. 2x

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Aplikujte preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech cukrovky konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Pšenice, ječmen	14	6	4	4
Cukrovka	12	6	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.