



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Věra Fridrichová /545 110 474

E-MAIL: vera.fridrichova@ukzuz.cz

DATUM: 28. 8. 2014

NUPRID 600 FS (white) – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cukrovka	mšice maková, květilka řepná, maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný	150 ml /VJ (výsevní jednotka = 100000 semen)	AT		

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Plodina, oblast použití.	Dávka vody.	Způsob aplikace
cukrovka	podle typu mořičky	moření osiva

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení – mořičky.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.

Pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.