



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,

organizační složka státu

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407

E-MAIL: eva.bouskova@ukzuz.cz

DATUM: 1. 12. 2014

Alfametrin ME – rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
bob na zrna	mšice	0,2 l/ha	7	max. 2x
bob na zrna	třásněnky	0,25 l/ha	7	max. 2x
borovice, modřín, listnaté dřeviny okrasné	kůrovci	0,6 %	AT	3) preventivně; max. 1x
borovice, modřín, listnaté dřeviny okrasné	kůrovci	1 %	AT	3) asanace a příprava lapáků; max. 1x
brambor	mandelinka bramborová	0,25 l/ha	14	max. 2x
hrách na zrna	obaleč hrachový	0,25 l/ha	10	max. 2x
jehličnany	dřevokaz čárkovaný	2 %	AT	3) preventivně; max. 1x
jehličnany	dřevokaz čárkovaný	4 %	AT	3) asanace; max. 1x
jehličnany	klikoroh borový	1 %	AT	3) máčení max. 1x
kukuřice setá na zrna	zavíječ kukuřičný	0,6 l/ha	84	max. 1x
len setý	dřepčící	0,3 l/ha	49*	max. 2x
len setý	třásněnka lnová	0,5 l/ha	56*	max. 1x
pšenice, žito	bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci	0,2 l/ha	21	max. 2x
tritikale	bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci	0,2 l/ha	21	max. 2x; pouze do začátku kvetení BBCH 50
ječmen, oves	bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci	0,2 l/ha	35	max. 2x

ředkvička semenné porosty	pilatka řepková	0,3 l/ha	AT	max. 2x
řepka olejka	krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová	0,2 l/ha	49	max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá, zelenina brukvovitá	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, pilatka řepková	0,3 l/ha	AT	1) semenné porosty; max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá, zelenina brukvovitá	blýskáček řepkový	0,2 l/ha	AT	1) semenné porosty; max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, pilatka řepková	0,3 l/ha	49	max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá	blýskáček řepkový	0,2 l/ha	49	max. 2x
smrk	lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku	0,6 %	AT	3) preventivně; max. 1x
smrk	lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku	1 %	AT	3) asanace/příprava lapáků; max. 1x
vojtěška semenné porosty	třásněnky, klopušky	0,4 l/ha	AT	max. 1x
zelenina brukvovitá (jen vytvářející růžice a hlávky)	housenky	0,3 l/ha	10	max. 2x
réva vinná	obaleči	0,02%	21	max. 2x

* OL jsou stanoveny pro len určený k potravinářským účelům

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu

Nejvyšší počet aplikací v roce:

2 x v bramborách, bobu, v hrachu na zrna, ve lnu (dřepčici), v semenných porostech řepky olejky, hořčice bílé a zeleniny brukvovité, v brukvovité zelenině (jen vytvářející růžice a hlávky), v semenných porostech ředkvičky a v obilninách

1 x v ostatních plodinách

Aplikační dávka vody: 200-600 l vody/ha (polní plodiny, zelenina)
200-1000 l vody/ha (prostorové plodiny)

Preventivní postřik klád na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému se provádí zpravidla zádoovým postřikovačem – spotřeba aplikační kapaliny – 5 l/m³.

Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti klikorohu borovému – spotřeba aplikační kapaliny – 20 l/1000 sazenic.

Přípravek se aplikuje postřikem anebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Alfametrin ME	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice	20	10	6	4
Brukvovitá zelenina	20	8	4	4
Vojtěška	14	8	4	4
Řepka ozimá	10	5	4	4
Řepka jarní, hořčice	10	4	4	4
Len	20	8	4	4
Hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny	8	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
Vinná réva	15	10	5	5
Kukuřice	NELZE	15	10	3
Brukvovitá zelenina a len	30	10	3	3
Hořčice a řepka	30	10	3	0
Vojtěška, hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny	10	5	3	0

Při aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po aplikaci.

Při ošetřování přípravkem v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 3 dnů po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů;

- po dobu 3 dnů po ošetření zamezit (popř. omezit) vstupu osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše;
- areály, které lze uzavřít, by měly být uzavřeny.