



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,

organizační složka státu

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Karla Pallichová Vymětalová/545 110 443

E-MAIL: karla.pallichova-vymetalova@ukzuz.cz

DATUM: 3.6.2015

Bromoterb – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	1,5-2 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 18 BBCH 2) od: 10 BBCH, do: 18 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
kukuřice	200-400 l/ha	postřik	max. 1x

Dávka 1,5 l/ha

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, pětour maloúborný, prlina rolní, plevle heřmánkovité, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, lilek černý, mléče, ptačinec žabinec, peníze rolní, rozrazil perský, řepka olejka-výdrol, chrpa modrák, merlík bílý, svízel přítula, hluchavky, hořčice, rozrazil polní, violka rolní

Plevele méně citlivé: rdesno ptačí

Dávka 2 l/ha

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, merlík bílý, durman obecný, svízel přítula, pětour maloúborný, hluchavky, prlina rolní, plevle heřmánkovité, opletka obecná, lilek černý, mléče, ptačinec žabinec, peníze rolní, violka rolní, rozrazil perský, rdesno ptačí, hořčice, rozrazil polní

Nižší dávku aplikujte rovněž na plevle v raných růstových fázích.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fyto toxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:

Po předčasném zaorání porostu lze pěstovat kukuřici a hrách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek není určen do množitelských porostů.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena i trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače),
2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3. Opakujte postup podle bodu 2 ještě jednou.
4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice	4	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.