



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Libuše Konopíková /545 110 489

E-MAIL: libuse.konopikova@ukzuz.cz

DATUM: 23. 7. 2015

Nuance – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý, tritikale, žito	plevele dvouděložné	15 g/ha	AT	1) od: 13 BBCH, do: 39 BBCH

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní, nebo jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevle: ptačinec žabinec, hluchavka nachová, konopice rolní, hořčice rolní, mák vlčí, rmeny, pomněnka rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, popenec břečťanolistý

Méně citlivé plevle: zemědým lékařský

Růstová fáze plodin v době aplikace:

BBCH 13 – 39, tj. 3. list rozvinutý – fáze jazýčku

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu

Dávka vody: 200 l/ha

Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Nepoužívejte v porostech trpících stresem (sucho, promáčení, poškození mrazem, škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání ošetřeného porostu je možné zařadit pouze obilniny.

Po 3 měsících po zaorání je možné zařadit také řepku olejnou nebo bob.

Po aplikaci herbicidu Nuance je možné ve stejném kalendářním roce zařadit obilniny, řepku olejnou a bob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Nuance	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý, tritikale, žito	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves setý, tritikale, žito	5	0	0	0