



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jana Ondráčková /545 110 470

E-MAIL: jana.ondrackov@ukzuz.cz

DATUM: 18. 6. 2015

Granstar 75 WG – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, tritikale ozim, žito ozim	plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, šťovíky	25 g/ha 200-400 l vody/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 29 BBCH 2) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH 3) max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: plevle heřmánkovité, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, mák vlčí, rmeny, merlíky, mléč rolní, pcháč oset, šťovíky

Plevele méně citlivé:

svízel přitula, smetánka lékařská, zemědým lékařský

Růstová fáze plodin v době ošetření:

BBCH 12-29, tj. 2. list až konec odnožování

Růstové fáze plevelů:

BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy;

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem (extrémní teploty, zamokření) ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5% a > 10%.

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:

Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem Granstar 75 WG lze vysévat pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Granstar 75 WG.