



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Marcela Nováková /545 110 471

E-MAIL: marcela.novakova@ukzuz.cz

DATUM: 27. 7. 2015

Granstar 50 SX - rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozim, ječmen jarní	plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, šřovíky	30 g/ha 200-400 l vody/ha	AT	1) od: 21 BBCH, do: 29 BBCH 2) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH 3) max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: plevle heřmánkovité, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, mák vlčí, rmeny, merlíky, mléč rolní, pcháč oset, šřovíky

Plevele méně citlivé:

svízel přítula, smetánka lékařská

Růstová fáze plodin v době ošetření:

pšenice ozimá, ječmen jarní – BBCH 21-29, tj. fáze odnožování

Růstové fáze plevelů:

BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy;

Maximální počet ošetření plodiny: 1x za vegetační sezónu

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem (extrémní teploty, zamokření) ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5% a > 10%.

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:

Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem Granstar 50 SX lze vysévat pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Granstar 50 SX.