



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jana Ondráčková / 545110470

E-MAIL: jana.ondrackova@ukzuz.cz

DATUM: 5.10. 2015

AMISTAR TOP

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
cukrovka	cerkosporióza řepy	0,75 l/ha 200-500 l vody /ha	32	3) max. 2x
slunečnice	fomová hniloba	1 l/ha 200-400 l vody /ha	AT	3) nejpozději v BBCH 55, max. 2x

Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: max. 2x

Interval mezi aplikacemi: cukrovka 30 dní; slunečnice 15 dní

Aplikační dávka vody: cukrovka 200-500 l/ha; slunečnice 200-400 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem.

Na etiketě je možné uvést věty:

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti alternáriové skvrnitosti ve slunečnici.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti padlí řepnému v cukrovce.

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Top.

Amistar Top nesmí být použit v době, kdy hrozí nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech cukrovky.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní) zbytky přípravku Amistar Top.