



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Marcela Nováková /545 110 471

E-MAIL: marcela.novakova@ukzuz.cz

DATUM: 11. 11. 2015

CHISEL 51.6 WG - rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	chundelka metlice, plevle dvouděložné	90 g/ha + 0,1 % Trend 90 - TM	AT	1) postemergentně na jaře, od 12 BBCH do 31 BBCH	
pšenice jarní, ječmen jarní, oves	chundelka metlice, plevle dvouděložné	60 g/ha + 0,1 % Trend 90 - TM	AT	1) postemergentně, od 12 BBCH do 31 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito	200-400 l/ha	postřik	max. 1x

V ozimých obilninách aplikujte CHISEL 51.6 WG postemergentně na jaře od 2. listu obilniny do fáze 1. kolénka (BBCH12-31) k hubení chundelky metlice (2-3 listy), svízele přítuly (max. 3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2-6 pravých listů.

V jarních obilninách bez podsevu aplikujte CHISEL 51.6 WG postemergentně od 2. listu obilniny do fáze 1. kolénka (BBCH12-31) k hubení chundelky metlice (2-3 listy), svízele přítuly (max. 3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2-6 pravých listů.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevle

Chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, rmeny, heřmánky, merlík bílý, kakost maličký, ptačinec žabinec, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, pohanka opletka, rdesno blešník, rdesno ptačí, konopice polní, pomněnka rolní, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, rozrazil rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, violka rolní, výdrol řepky

Méně citlivé plevele

Pcháč oset, svízel přitula, rozrazil polní

Při použití přípravku bez smáčedla Trend 90 nelze vyloučit snížení účinnosti.

CHISEL 51.6 WG lze použít na lehkých, středních i těžkých půdách, nedoporučuje se aplikovat na písčitých a velmi lehkých půdách a dále tam, kde dochází snadno k podmáčení.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Použití v pšenici tvrdé konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Náhradní plodiny

Je-li nutno zaorat obilninu ošetřenou herbicidem CHISEL 51.6 WG lze jako náhradní plodinu pěstovat pouze jarní obilniny.

Následné plodiny

Po jarní aplikaci přípravku lze v témže roce na podzim jako následnou plodinu zařadit ozimé obilniny nebo ozimou řepku. V roce následujícím po ošetření je možné zařadit všechny jednoleté polní jarní plodiny.

Použití orby snižuje riziko poškození následných nebo náhradních plodin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Obilniny	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Obilniny	5	5	5	0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.