



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jana Ondráčková / 545110470

E-MAIL: jana.ondrackova@ukzuz.cz

DATUM: 25. 11. 2015

Dicopur D – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
kukuřice setá	pcháč oset, šťovík, plevle dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha 400-500 l vody /ha	AT	1) ve f. 14 BBCH výška rostlin 15-20 cm 3) max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevle:

svlačec rolní, pcháč oset, hluchavky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, šťovíky, merlíky, mák vlčí, penízek rolní, pryskyřníky

Méně citlivé plevle:

plevle heřmánkovité, zemědým lékařský, hlaváček letní, rdesna, svízel přitula, rozrazil, violky, laskavec ohnutý, pomněnka rolní, konopice polní, durman obecný, kopretina osenní, kakosty

Růstová fáze plodin v době ošetření: BBCH 14, tj. 4 pravé listy, výška rostlin 15-20 cm

Růstová fáze plevelů:

- plevle dvouděložné jednoleté, šťovíky – přípravek je účinný na aktivně rostoucí
- pcháč oset – 9 listů až 20% konečné velikosti (průměru), tj. BBCH 19-32

Maximální počet aplikací: 1x za vegetaci

Přípravek se aplikuje postřikem.

Po aplikaci nesmí 4 – 6 hodin pršet.

Neošetřovat při teplotách nižších než 10°C.

Neaplikovat při nebezpečí nočních mrazíků, neošetřovat zeslabené porosty.

Z důvodu rizika fytotoxicity na ošetřovaných porostech nepoužívejte přípravek při teplotách nad 23°C!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimořádně citlivými jsou vinná réva a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty) za vysokých teplot (nad 23°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicopur D.