



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424

E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.cz

DATUM: 30. 11. 2015

Basagran Super – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
bob, hrách, len, jetel plazivý, brambor, kukuřice, obilniny	plevele dvouděložné	1,5-2 l/ha 200-400 l vody /ha	AT	1) postemergentně 3) max. 1x
kukuřice, jeteloviny podsev	plevele dvouděložné	1,5-2 l/ha 200-400 l vody /ha	AT	1) postemergentně 3) max. 1x
obilniny, jeteloviny podsev, trávy podsev	plevele dvouděložné	1,5-2 l/ha 200-400 l vody /ha	AT	1) postemergentně 3) max. 1x

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o použití, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Dávku 1,5 l/ha se doporučuje aplikovat v raných růstových fázích plevelů (do 2 pravých listů) a za vhodných podmínek (vyšší teploty a vyšší vlhkost). Dávku 2 l/ha se doporučuje aplikovat v pozdějších růstových fázích, kdy plevelé mají 3-4 pravé listy, případně za zhoršených podmínek (nižší teploty, nižší vzdušná vlhkost).

Citlivé plevelé: heřmánky, rmeny, brukvovité plevelé, laskavce, merlíky, svízel přítula, mléč zelinný, kolenec rolní, kopřiva žahavka

Méně citlivé plevelé: pryšce, mák vlčí, violka rolní

Odolné plevelé: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazil, svlačec rolní a šťovíky.

Při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 23°C by se postřik neměl provádět. Nejvhodnější doba pro ošetření přípravkem BASAGRAN SUPER je zrána nebo k večeru při zamračeném počasí. Po ošetření by nemělo následujících alespoň 5 hodin pršet. Někdy lze pozorovat po aplikaci mírné zesvětlení barvy listů kulturní plodiny, jež však s postupným růstem mizí.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky. Je třeba se vyvarovat místního předávkování. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BASAGRAN SUPER.

Tank mix kombinace len

Přípravek lze ve lnu použít v tank-mix kombinaci s přípravkem **GLEAN 75 WG** v dávce **10 g/ha** v souladu s jeho návodem na použití.

Dávkování:

1,5 l/ha BASAGRAN SUPER + 10 g/ha GLEAN 75 WG

Aplikace se provádí na vzešlé plevy, které jsou ve fázi 2-4 pravých listů. Postřik nelze provádět na porost lnu vyšší než 12 cm. Není vhodné ho provádět po silnějších deštích, kdy je smyta povrchová vrstva na lnu. Při aplikaci nejsou potřebné nové trysky.

Citlivé plevely: svízel přítula, pětour malolobný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědělský lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinový, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.

Méně citlivé plevely: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.

Odolné plevely: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazil, svačec rolní a šťovíky.

Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci ve fázi 2 – max. 4 listů plevelů.

Při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 23°C by se postřik neměl provádět. Nejvhodnější doba pro ošetření přípravkem BASAGRAN při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to do suchého porostu. Po ošetření by nemělo následujících 5 hodin pršet. Někdy lze pozorovat po aplikaci mírné zesvětlení barvy listů kulturní plodiny, které však s postupným růstem mizí.

Obilniny a trávy na semeno se ošetřují od fáze 3-4 listů do začátku sloupkování

Obilniny s podsevem jetele lučního nebo vojtěšky: Ošetřuje se po vývinu prvního trojlístku, kdy plevely mají 2 – 4 listy.

Hrách, bob: Aplikace se provádí při výšce hrachu nebo bobu 5 – 15 cm, když plevely mají 2 – 4 listy.

Fazole: Aplikace se provádí ve stadiu 2 – 3 pravých listů fazolů.

Sója: Ošetření se provádí v době, kdy se plevely nacházejí ve fázi 2 – 4 listů a sója ve fázi 1 – 3 pravých listů.

Len: Aplikace přípravku se provádí do výšky 4 cm lnu, kdy je většina plevelů vzešlých (konopice polní a hluchavky nesmějí mít víc než 2 páry pravých listů).

Brambory: Ošetření se provádí ve fázi 2 – 4 listů plevelů.

Kukuřice se ošetřuje do výšky 20 cm, na plevely ve fázi 2-4 listů

Jeteloviny se ošetřují ve fázi 2-3 trojlístků

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky.

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BASAGRAN.