



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424

E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.cz

DATUM: 1. 12. 2015

Picon – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	3 l/ha	AT	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Spektrum plevelů

Plevelé citlivé – *chundelka metlice, svízel přitula, heřmánky, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, rozrazil, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní, mál vlčí, peníze rolní*

Růstová fáze plodin v době aplikace:

BBCH 11-13, tj. 1. list plně rozvinutý až 3. list

Růstové fáze plevelů:

BBCH 11-13, tj. 1. - 3. list

Max. počet aplikací: 1x v plodině, na podzim

Dávka vody: 200-400 l/ha

Před aplikací nebo po aplikaci přípravku porost nevláčet ani neválet.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných dvouděložných meziplodin a řepky olejky.

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Picon	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, triticales ozimé	20	14	8	4