



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470
E-MAIL: jana.ondrackova@ukzuz.cz

DATUM: 19.4.2016

Menara - rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rez ječná, rez plevová	0,5 l/ha	42	
pšenice	braničnatka plevová, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	42	
tritikale	braničnatka plevová, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	42	
žito	braničnatka plevová, padlí travní, rez žitná, rez plevová, braničnatka pšeničná	0,5 l/ha	42	
pšenice	fuzariózy klasů	0,5 l/ha	AT	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. Proti fuzariózám klasů se přípravek aplikuje od vývojové fáze BBCH 61 (počátek květu) do BBCH 69 (konec květu).

Na etiketě je možné uvést větu: „Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene.“

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek lze použít v tank-mix kombinaci s přípravkem Amistar v souladu s návodem na jeho použití. Dávkování je nutno konzultovat s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
obiloviny	4	4	4	4