



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424

E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.cz

DATUM: 8. 6. 2016

Pyrinex M22 – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
chryzantéma	mšice	1,3 l/ha (0,13 %)	AT	
jabloň	pilatka jablečná	2,7 l/ha	21	
jabloň	obaleč jablečný	2,25 l/ha	21	
jabloň	mšice jabloňová, mšice jitrocelová	2,7 l/ha	21	
řepka olejka, hořčice bílá	blýskáček řepkový	1,5-2 l/ha	AT	3) vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu
sklady prázdné, sila prázdná, provozy	skladištní škůdci	1,3 % (0,2 l/15 l vody/ 100 m ²)	AT	
višeň	vrtule třešňová	2,7 l/ha	21	
zelenina brukvovitá	mšice zelná	1,3 l/ha (0,13 %)	AT	1) semenné porosty

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Všechny plodiny se ošetřují max. 1x za vegetační období.

Prázdná sila a sklady, provozy se ošetřují max. 1x za rok.

Termín aplikace:

Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje podle signalizace, BBCH 50 – BBCH 59.

Proti pilatce jablečné na jabloních se ošetřuje podle signalizace.

Proti obaleči jablečnému na jabloních se ošetřuje podle signalizace.

Proti mšici jabloňové a mšici jitrocelové na jabloních se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti vrtuli třešňové na višních se ošetřuje podle signalizace.

Proti mšici zelné na zelenině brukvovité se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti mšicím na chryzantémách se ošetřuje od začátku výskytu.

Proti skladištním škůdcům ve skladech prázdných, silech a provozech se ošetřuje před jejich naskladněním, podle schváleného technologického postupu.

Aplikace přípravku:

V řepce olejce, hořčici bílé, zelenině brukvovité a chryzantémách se přípravek aplikuje postřikem.

V jabloních, a višních se přípravek aplikuje rosením.

V provozech, prázdných silech a skladech se přípravek aplikuje speciálními aplikátory.

Vzhledem k množství odrůd chryzantém je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Pyrinex M22	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Řepka, hořčice, zelenina, chryzantémy	4	4	4	4
Ovocné sady	NELZE	30	20	16

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno ošetření sadů přípravkem Pyrinex M22 na plochách svažujících se k povrchovým vodám.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.