



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424

E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.cz

DATUM: 13. 6. 2016

Dursban Delta – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
řepka olejka	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	2,25 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	
řepka olejka	blýskáček řepkový	1,75 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	
hořčice bílá	blýskáček řepkový	1,75 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	
mák setý	krytonosec kořenový	2,25 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	
mák setý	mšice maková	1,75 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	
ječmen, pšenice, žito, tritikale	mšice	1,75 l/ha 300-400 l vody/ha	AT	

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Všechny plodiny kromě ječmene, pšenice, žita a tritikale se ošetřují max. 1x za rok.
Ječmen, pšenice, žito a tritikale se ošetřují max. 2x za rok.

Termín aplikace:

Proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje podle signalizace, BBCH 50-59.

Proti krytonosci kořenovému na máku setém se ošetřuje podle signalizace, od vzcházení do 5. pravého listu.

Proti mšici makové na máku setém se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Proti mšicím na obilninách se ošetřuje podle signalizace, do BBCH 59.

Aplikace přípravku:

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Mák setý, řepka olejka (2,25 l/ha)	50	25	20	4
Mák setý, řepka olejka, hořčice bílá (1,75 l/ha)	50	20	10	4
Ječmen, pšenice, žito, tritikale	50	20	10	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno ošetření máku setého a řepky olejky pro aplikační dávku 2,25 l/ha a ječmene, pšenice, žita a tritikale přípravkem na plochách svažujících se k povrchovým vodám.

Pro aplikaci dávky 1,75 l/ha do máku setého, řepky olejky a hořčice bílé:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.