



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agentury

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena Kolouchová/545 110 477

E-MAIL: alena.kolouchova@srs.cz

DATUM: 2.10.2013

Alister – rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozim	chundelka metlice, svízel přitula, plevle dvouděložné jednoleté	1 l/ha 300 l vody /ha	AT	1) od: 11 BBCH, do: 13 BBCH 3) max. 1x na podzim

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti:

Plevle citlivé:

chundelka metlice, svízel přitula, plevle heřmánkovité, hluchavka nachová, opletko obecná, ptačinec žabinec, peníze rolní, rozrazil perský, violka rolní, výdrol řepky olejky

Růstové fáze plevelů:

plevle dvouděložné jednoleté: BBCH 10-12, tj. děložní listy až 2 pravé listy,
chundelka metlice: BBCH 11-13, tj. 1-3 listy

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Po aplikaci přípravku ALISTER se mohou na ošetřeném porostu pšenice ozimé projevit zpravidla dočasné příznaky fyto toxicity – prořídnutí porostu, prožloutnutí porostu, případně drobné nekrózy – zvláště pokud po aplikaci dojde k větším jednorázovým srážkám, zejména na lehkých půdách.

Následné plodiny:

Při standardním osevním postupu lze jako následné plodiny vysévat bez omezení jakékoliv ozimé obilniny. V následující vegetační sezóně lze vysévat pšenicí jarní, ječmen jarní a cukrovku. Před setím jakýchkoliv jiných (mimo obilniny) plodin na podzim i na jaře je nutné zpracovat půdu tak, aby bylo dosaženo úplného převrácení ornice, např. hlubokou orbou.

Na následně pěstované řepce olejce ozimé se mohou na děložních listech projevit symptomy fyto toxicity ve formě světlých skvrn.

Náhradní plodiny:

Pokud dojde k potřebě přeseť z jakéhokoliv důvodu ošetřovanou plodinu po aplikaci přípravku ALISTER, je možné vysévat pouze pšenici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.