



ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agentury

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena Kolouchová/545 110 477

E-MAIL: alena.kolouchova@srs.cz

DATUM: 7.10.2013

HUSAR OD – rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozim, žito ozim, tritikale ozim	chundelka metlice, plevele dvouděložné	0,075-0,1 l/ha 300 l vody /ha	AT	1) od: 13 BBCH, do: 32 BBCH 3) postemergentně, na jaře, max. 1x za vegetaci

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1x za vegetaci

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé:

chundelka metlice, svízel přitula, heřmánkovité plevele, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, konopice polní, svazenka vratičolistá, vikve

Méně citlivé: rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní, hluchavka nachová, pcháč rolní, pomněnka rolní, pohanka opletka

Husar OD lze aplikovat kdykoliv na jaře od fáze BBCH 13 (3. list) do fáze 32 (2. kolénko); optimálně však do konce odnožování obilniny, neboť při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé a účinek nemusí být za všech okolností spolehlivý.

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení

do 6 listů, jednoděložné do konce odnožování; později účinnost, zejména za nepříznivých podmínek a u méně citlivých plevelných druhů může klesat. Pcháč oset je optimálně huben

ve fázi přízemní listové růžice (do max. 10-15 cm výšky).

Při použití **dávky 0,075 l/ha** může být snížena účinnost na violku rolní, hluchavku nachovou, pomněnku rolní, pcháč oset případně na svízel přitulu a chundelku metlici **zejména**

při silném výskytu chundelky metlice, případně v podmínkách méně příznivých pro aplikaci (pokročilejší růstová fáze, nízká vzdušná vlhkost, sucho, chlad...).

Neaplikovat na porost oslabený suchem, mrazem či naopak vysokými teplotami a podmáčením.

Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Při standardním postupu pro střídání plodin přicházejí v úvahu jako následné plodiny po použití Husaru OD ozimé plodiny a plodiny jarní v další sezóně. Pro tyto plodiny není žádné omezení po použití Husaru OD v povolené dávce.

Pro posílení jistoty je třeba po jarní aplikaci přípravku Husar OD, pokud má být v daném roce vysévána ozimá řepka nebo hořčice či různé směsky pro zelené hnojení, provést před výsevem zpracování půdy do hloubky 15-20 cm. Při jejich výsevu bez zpracování půdy může dojít k poškození těchto plodin.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně

než 120 dní, ozimá řepka, hořčice či letní meziplodiny při souhrnu nepříznivých okolností mohou být poškozeny. Po aplikaci přípravku Husar OD nevysévat řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemcích s alkalickou půdou. Po aplikaci přípravku Husar OD na alkalických půdách je zvýšené nebezpečí poškození následné ozimé řepky, hořčice a dalších letních meziplodin.

Na jaře následujícího roku lze vysévat libovolnou plodinu.

Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat plodiny ošetřené Husarem OD v povolené dávce, lze 15 dní po aplikaci bezorebně vysévat jarní pšenici nebo jarní ječmen. Z ostatních náhradních plodin je možné použít kukuřici. Je však nutné provést orbu či zpracování půdy do hloubky 15-20 cm a vysetí náhradní plodiny v intervalu nejméně 30 dní po aplikaci Husaru OD v povolené dávce.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu sulfonylmočoviny, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o povolení.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.