



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: JANA JEŽKOVÁ /545 110 478

E-MAIL: jana.jezkova@ukzuz.cz

DATUM: 1. 12. 2015

APEL

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
slunečnice roční	hlízenka obecná	1 l/ha 400 l vody /ha	AT	1) od: 59 BBCH, do: 65 BBCH 3) max. 1x
řepka olejka	fomové černání krčku řepky olejné	1 l/ha 350-600 l vody /ha	AT	1) na podzim BBCH 14-19, na jaře nejpozději do BBCH 39, celkem max. 2x
řepka olejka	hlízenka obecná	1 l/ha 350-600 l vody /ha	AT	1) od: 61 BBCH, do: 65 BBCH, celkem max. 2x
pšenice	braničnatka plevová, padlí travní, rez pšeničná	1 l/ha 200-600 l vody /ha	42	3) max. 2x
ječmen	padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene	1 l/ha 200-600 l vody /ha	42	3) max. 2x
cukrovka, řepa krmná	cerkosporioza řepy	0,8-1 l/ha 200-600 l vody /ha	21-30	3) max. 2x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé.

Účinnost přípravku APEL proti rzi pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci.

Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.