



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407
E-MAIL: eva.bouskova@ukzuz.cz

DATUM: 7. 2. 2017

Belvedere – rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
cukrovka	plevele dvouděložné jednoleté	1 l/ha	AT	3) aplikace opakovaná

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Maximální počet aplikací v plodině: 3x

Dávka vody: 150-250 l/ha

Přípravek se aplikuje ve třech ošetřeních pro potlačení postupně vzcházejících plevelů. První ošetření se provádí v růstové fázi cukrovky BBCH 10 (děložní listy rozvinuty) v době, kdy jsou plevelé nejcitlivější, tj. ve fázi BBCH 09-10 (vzcházení - objevení se děložních lístků). Druhá aplikace je v závislosti na aktuálním průběhu počasí a růstu plevelů v době, kdy začíná vzcházet další vlna plevelů ve fázi děložních listů až základu prvního páru pravých listů, maximálně do čtyř pravých listů plevelů (BBCH 10-14). Třetí aplikace je v době vzcházení třetí vlny plevelů ve fázi děložních listů až základu prvního páru pravých listů, maximálně do čtyř pravých listů plevelů (BBCH 10-14). Minimální interval mezi dvěma aplikacemi je 7 dnů.

Citlivé plevelé:

hluchavka nachová
kokoška pastuší tobolka
laskavec srstnatý/ohnutý
merlík bílý
penízek rolní
ptačinec žabinec
rozrazil perský
violka rolní
violka trojbarevná

Méně citlivé plevelé:

heřmánek nevonný/heřmánkovec přímořský
pohanka svlačcovitá
svízel přítula
výdrol řepky

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Za jasných dní se silným slunečním svitem lze, vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky, aplikovat přípravek Belvedere až v podvečer, při teplotách nepřesahujících 25°C (měřeno 5 cm nad povrchem půdy).

Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Za podmínek nepříznivých pro růst nelze vyloučit přechodné poškození řepy (zbrždění růstu, chlorózy, deformace listů).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Belvedere	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Cukrovka	4	4	4	4

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.