



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Praha 26.9.2011
čj. SRS 056034/2011

Oblastní odbor SRS

Ztracená 1099/10

161 00, Praha 6

Zpráva č. 18 oblastního odboru PRAHA o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 29.8.–25.9.2011

1. Počasí

Uplynulé sledované období bylo krásným babím létem s příjemnými odpoledními teplotami. V prvním sledovaném týdnu se ranní teploty pohybovaly v rozpětí od 7 °C do 14 °C, odpolední od 18 °C do 28 °C. Teploty měly vzestupnou tendenci. Ve druhém týdnu došlo k poklesu odpoledních teplot. Držely se v rozmezí od 15 °C do 22 °C, ranní neklesly pod 11 °C. Od třetího týdne došlo k postupnému poklesu hlavně ranních teplot. Na počátku dosahovaly až 16 °C, o posledním sledovaném víkendu již jen 5 °C. Odpolední teploty většinou atakovaly 20 °C. Nejchladnějším dnem bylo 19. září, kdy odpolední teplota vystoupila na 11 °C, naopak nejteplejším dnem bylo 11. září s odpoledním maximem 29 °C. V oblasti spadlo od 40 mm do 60 mm srážek. Nejdeštivějším dnem bylo 18. září. Místa napršelo až 40 mm vody. Mlhavá rána již zvyšují svoji četnost.



2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Povětrnostní podmínky letos přály časně setým řepkám. Některé porosty dostaly vláhu ihned po zasetí, takže začaly vzcházet již po čtyřech dnech. Naopak srážky zkomplikovaly sklizeň bobu a chmele. Sklizeň chmele probíhala ještě v minulém týdnu. Na severu okresu Kladno zůstaly nesklizeny 4 ha chmelnic kvůli přebytku chmele na trhu. Dosud nesklizené zůstávají pouze porosty slunečnice, brambor a řepy. Zůstávají i zbylé porosty bobu a malé hony pšenice.

OBILNINY

Probíhá setí ozimých obilnin. Lokálně je již vzešlá pšenice ozimá, rostliny mají až 3 listy. Vzešlý je i ozimý ječmen.

PŠENICE OZIMÁ (RF 00-13 BBCH)

Místy byl na výdrolech pšenic v okrese Kladno (Běleč, Bratronice, Kyšice, Kamenné Žehrovice, Pchery, 22.9.) zaznamenán střední až silný výskyt kříška polního (*Psammotettix alienus*), a to hlavně na zaplevelených pozemcích. Některé rostliny jeví známky napadení virózami.



JEČMEN OZIMÝ (RF 10-13 BBCH)

Lokálně byl na výdrolech ječmenů v okrese Kladno (Běleč, Bratronice, Kyšice, Kamenné Žehrovice, Pchery, 22.9.) zaznamenán střední až silný výskyt **kříška polního** (***Psammotettix alienus***), a to také na zaplevelených pozemcích.

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 11-19 BBCH)

Časně seté porosty jsou většinou dobře zapojené a vyrovnané. Vzhledem k počasí je část ploch přerostlá. Později seté řepky jsou naopak malé, lokálně mezerovité a vývojově nevyrovnané.

V okrese Kladno (Bratronice, 6.9., Řevničov, Kačice 13.9.) se na spodních listech vzrostlých rostlin lokálně objevuje ve slabých výskytech **fómová hníloba brukvovitých** (***Leptosphaeria maculans***). Další z chorob, které se dají místy ve slabých výskytech najít na spodních listech v okrese Kladno (Bratronice 6.9., Řevničov 13.9., Pchery 22.9.) je **plíseň brukvovitých** (***Peronospora parasitica***).

Na listech se všeobecně objevují poměrně velké plošné miny způsobené **vrtalkou zelnou** (***Phytomyza rufipes***), a to v okrese Kladno (Kačice 30.8., Bratronice 6.9., Řevničov 13.9., Pchery 22.9.)

V okrese Beroun (Hýskov, 9.9.) jsou porosty poškozeny zatím pouze žírem **dřepčíka olejkového** (***Psylliodes chrysocephalus***). Jednalo se především o poškozené děložní lístky.

Silný výskyt **slimáčků** (***Deroceras sp.***) byl zaznamenán v okrese Mladá Boleslav (Velké Všelisy, 19.9.). Napadeny byly především souvratě. Další výskyty byly ohniskovitě rozmístěny po celém poli. Pět hektarů bylo ošetřeno.

V okrese Kutná Hora (Český Brod, Plaňany) zjištěn na 120 ha střední výskyt **hraboše polního** (***Microtus arvalis***).

OKOPANINY

BRAMBOR (87-95 BBCH)

Probíhá sklizeň, z letošní sklizně budou pravděpodobně vysoké výnosy.

I přes velký infekční tlak byly letos v oblasti zaznamenány jen slabé výskyty **plísně bramboru** (***Phytophthora infestans***).

Pozorovány lokální slabé výskyty **aktinomycetové obecné strupovitosti bramboru** (***Streptomyces scabies***), a to všeobecně v okresech Benešov, Kutná Hora a Příbram.

KUKUŘICE (RF 89-99 BBCH)

Probíhá sklizeň kukuřice na siláž, sklizeň se vyznačuje velkým množstvím hmoty.

Příznaky napadení **fuzariózami kukuřice** (***Fusarium spp.***) se všeobecně objevují v okrese Kladno.

V okrese Beroun (Chyňavsko, Mořinsko, 19.9.) zjištěny až střední výskyty **obecné sněti kukuřičné** (***Ustilago maydis***) v porostech. V okrese Kladno a Kutná Hora všeobecně sledovány pouze slabé výskyty.

Zjištěn první slabý výskyt **zavíječe kukuřičného** (***Ostrinia nubilalis***) v okrese Beroun (Libomyšl, 8.9.). V okrese Příbram pozorovány všeobecně slabé výskyty.

Bázlivec kukuřičný (***Diabrotica virgifera virgifera***) – opět zjištěny další výskyty dospělců ve feromonových lapácích v okrese s kontinuálním šířením Kutná Hora, dále v okresech nárazníkové zóny Nymburk, Benešov a Kolín. V dalších okresech nárazníkové zóny Praha hl.m., Praha-východ a Praha-západ dospělci nezjištěni. **Další výskyty dospělců ve feromonových lapácích mimo tyto zóny již nebyly zjištěny.** Vzhledem k probíhající sklizni se pozorování postupně ukončuje.



ŘEPA CUKROVKA (RF 39-49 BBCH)

V okrese Nymburk byla zahájena sklizeň porostů.

Virová žloutenka řepy (Beet yellows virus) zjištěna ve slabém výskytu v okrese Kutná Hora (Suchdol u Kutné Hory).

V okrese Kladno byly pozorovány slabé výskyty **cerkosporové listové skvrnitosti řepy (Cercospora beticola)**. Jen v ohniscích jsou lokálně listy poškozeny silněji. Ostatní choroby se také objevují pouze ve slabých výskytech. Jedná se o **tečnatku řepnou (Pleospora betae)**, **přeslenatku (Verticilium Nees)**, a **padlí řepy (Erysiphe betae)** (Tuchlovice, 12.9., Vyšíněk, 20.9., Zlonice 20.9.).

OVOCNÉ DŘEVINY

Jádroviny

JABLOŇ (RF 85-89)

Ve feromonových lapácích pozorovány ke konci sledovaného období v oblasti jen slabé výskyty **obaleče jablečného (Cydia pomonella)** a **obaleče jabloňového (Hedya nubiferana)**. Pouze na plodech zjištěn v okrese Kutná Hora (Kutná Hora, 5.9.) střední výskyt obaleče jablečného.

Zjištěn střední výskyt **hraboše polního (Microtus arvalis)** v okrese Kutná Hora (Tuchoraz) v sadech na 106 ha.

Peckoviny

SLIVOŇ (RF 85-89)

Slabé výskyty **obaleče švestkového (Cydia funebrana)** pozorovány ke konci sledovaného období ve feromonových lapácích v celé oblasti.

Za oblastní odbor Praha zpracoval: Ing. Karel Štefan