



Praha 31.10.2011
čj. SRS 061141/2011

Oblastní odbor SRS
Ztracená 1099/10
161 00, Praha 6

Zpráva č. 19 oblastního odboru PRAHA o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 26.9.–30.10.2011

1. Počasí

Na počátku sledovaného období pokračovalo krásné babí léto s příjemnými odpoledními teplotami. V prvním sledovaném týdnu se ranní teploty pohybovaly v rozpětí od 6 °C do 12 °C, odpolední od 18 °C do 25 °C. Takto vysoké teploty vydržely do 5. října, kdy došlo k poklesu nejprve odpoledních teplot a od 7. října došlo ke snížení i ranních teplot. Nejchladněji bylo v období mezi 14. až 23. říjnem, kdy ranní teploty klesly až k -3 °C. Poté následovalo oteplení s ranními teplotami od 3 °C do 8 °C a odpoledními teplotami okolo 11 °C. Tento ráz počasí se udržel až do konce sledovaného období. První mrazivé ráno v období přišlo 15. října. Dne 22. října vystoupila odpolední teplota pouze na 3 °C. Srážky v období byly málo intenzivní. V oblasti spadlo od 25 mm do 46 mm srážek. Nejdeštivějším dnem byl 19. říjen. Místy napršelo do 10 mm srážek. Častým jevem jsou mlhavá rána.



2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Dosud probíhá sklizeň brambor, cukrovky a kukuřice. Výnosy brambor dosahují rekordních hodnot. Ozimy jsou převážně zaseté, pokračuje setí ozimé pšenice. Celkový zdravotní stav ozimů je zatím dobrý.

OBILNINY

Stále probíhá setí ozimé pšenice. Dříve seté porosty jsou již vzešlé. Také porosty ozimého ječmene již vzešly.

PŠENICE OZIMÁ (RF 00-22 BBCH)

Na vzrostlejších porostech zjištěny první slabé výskyty **hnědé rzivosti pšenice** (*Puccinia persistens subsp. triticina*) na listech v okrese Kladno (Smečno, 20.10.).

Hlavně na odnožujících pšenících zjištěny slabé příznaky napadení **bzunkou ječnou** (*Oscinella frit*) v okrese Kladno (Smečno, 29.9.). Střední výskyt larev byl sledován v okrese Mladá Boleslav (Zdětín, 18.10.) na poli o výměře 20 ha.

V okrese Kladno (Smečno, 29.9.) byl zjištěn v porostech pšenice ozimé silný výskyt **kříška polního** (*Psammotettix alienus*). Dále byl zjištěn střední, místy až silný výskyt kříška na výdrolech pšenice ozimé v okrese Kladno (Šlapanice, Zlonice, 29.9.). V okrese Nymburk (Polabec, 12.10.) zjištěn slabý výskyt. Jeho aktivita poklesla s ochlazením v polovině října.



JEČMEN OZIMÝ (RF 10-21 BBCH)

V okrese Kutná Hora (Kobylnice nad Doubravou, Mezholezy, Miskovice, Svatý Mikuláš, 14.10.) zjištěny první slabé výskyty padlí ječmene (*Blumeria graminis*).

Ve slabých výskytech byla na listech v okrese Beroun (Mořina, 29.9., Chyňava, 6.10.) a Kladno (Kačice, 20.10.) pozorována síťovitá a okrouhlá skvrnitost ječmene (*Pyrenophora teres*).

V okrese Beroun (Mořina, 29.9.) zaznamenán první slabý výskyt napadení spálou ječmene (*Rhynchosporium secalis*).

Lokálně byl na výdrolech ječmenů v okrese Kladno (Hředle, Kačice, Mšec, 27.9.) zaznamenán silný výskyt kříška polního (*Psammotettix alienus*).

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 14-19 BBCH)

Vzhledem k průběhu počasí je část ploch přerostlá, na přerostlé porosty jsou aplikovány morforegulatory růstu. Na některých porostech v okresech Kladno a Kutná Hora došlo po mrazech k barevným změnám, které jsou nejvíce patrné na okrajích velkých listů.

V okrese Kladno (plošně), v okrese Příbram (lokálně) se na spodních listech vzrostlých rostlin lokálně objevuje ve slabých výskytech fómové černání stonku řepky (*Leptosphaeria maculans*) a plíseň zelná (*Peronospora parasitica*). Ta je pozorována ve slabém výskytu také v okrese Beroun (Hýskov, 26.9.).

Na listech se všeobecně objevují poměrně velké plošné miny způsobené vrtalkou zelnou (*Phytomyza rufipes*). Výskyty zjištěny v okrese Kladno (plošně) a Beroun (Hýskov, 26.9., Lužce, 29.9.).

Lokálně v okrese Příbram jsou porosty slabě poškozeny žírem dřepčíka olejového (*Psylliodes chrysocephalus*).

V okrese Kladno (Dřetovice, Hospozín, Stehelčevy, 29.9.) zjištěn místy silný výskyt hraboše polního (*Microtus arvalis*).

V okrese Beroun (Hýskov, 24.10.) byly nalezeny okousané listy srncem obecným (*Capreolus capreolus*).

OKOPANINY

BRAMBOR (87-95 BBCH)

Sklizeň stále není ukončena.

V okrese Kutná Hora a Nymburk zjištěny na intenzivně obhospodařovaných plochách jen slabé výskyty plísně bramboru (*Phytophthora infestans*).

Pozorován lokální střední výskyt aktinomycetové obecné strupovitosti bramboru (*Streptomyces scabies*), a to u odrůdy Jelly v okrese Kutná Hora. Ostatní výskyty v okresech Benešov, Kutná Hora a Příbram jsou všeobecně slabé.

Střední výskyt bakteriálního černání stonku a měkké hniloby hlíz bramboru (*Erwinia carotovora*) zjištěn v okrese Kutná Hora (Suchdol) na odrůdě Dali. Ostatní výskyty v oblasti jsou slabé.

KUKUŘICE (RF 97-99 BBCH)

Dokončuje se sklizeň kukuřice.

Střední výskyt napadení palic fuzariózami kukuřice (*Fusarium spp.*) zjištěn v okrese Kladno (Kačice, 27.9.).

V oblasti všeobecně zjištěny na ještě nesklizených porostech pouze slabé výskyty obecné sněti kukuřičné (*Ustilago maydis*).



ŘEPA CUKROVKA (RF 39-49 BBCH)

Probíhá sklizeň porostů.

Virová žloutenka řepy (Beet yellows virus) zjištěna plošně ve slabých výskytech v okrese Kutná Hora.

PASTVINY, LOUKY, TTP

TTP, Víceleté pícniny

Zjištěny střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** na pastvinách, loukách a ve vojtěšce v okrese Beroun (Hýskov, Chyňava, Vráž, 23.10.).

OVOCNÉ DŘEVINY

Jádroviny

JABLOŇ (RF 92-93)

Zjištěny střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** v okrese Kutná Hora (Český Brod, Plaňany, Poboří, Tuchoraz, Zibohlavý) v sadech na celkem 175 ha.

Za oblastní odbor Praha zpracoval: Ing. Karel Štefan