

Bob polní - předběžné výsledky zkoušek 2008
1. Oblast

Odrůda	Výnosy semene 2008 - dle lokalit			Ročníkové průměry				Průměr 2005, 2006, 2007, 2008
	Chlumec	Lednice	Věrovany	2008	2007	2006	2005	
Fuego	108	130	136	123	117	130	-	121
Albi ^x	105	104	111	107	110	108	102	106
Mistral ^x	110	106	110	109	109	100	102	104
Merlin ^{**x}	107	104	99	103	98	102	101	101
Merkur [*]	93	96	101	97	102	98	99	99
Borek	93	81	105	94	105	94	100	98
Průměr SSRO (*) (t/ha) = 100 %	3,23	2,26	2,78	2,76	2,89	3,80	4,96	3,60
MD 0.05 v %	6	11	11	13	13	14	6	7
Počet průměrovaných				3	3	4	4	14

2. Oblast

Odrůda	Výnosy semene 2008 - dle lokalit			Ročníkové průměry				Průměr 2005, 2006, 2007, 2008
	Jaroměřice	Staňkov	Šumperk	2008	2007	2006	2005	
Fuego	108	113	125	116	108	125	-	115
Mistral ^x	108	104	119	110	106	107	99	105
Borek	98	104	99	101	95	100	109	101
Merlin ^{**x}	102	102	105	103	105	100	98	101
Albi ^x	106	98	107	103	101	101	101	101
Merkur [*]	98	98	95	97	95	100	102	99
Průměr SSRO (*) (t/ha) = 100 %	2,24	5,13	3,89	3,75	5,08	4,35	5,94	4,78
MD 0.05 v %	8	8	17	10	5	6	7	8
Počet průměrovaných				3	5	5	4	17

^x - bělokvěté, beztaninové odrůdy

Fuego - menší počet dat, nová odrůda

1. Oblast - teplejší a sušší oblast zahrnující zkušební lokality umístěné v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné a řepařské

2. Oblast - chladnější a vlhčí oblast zahrnující zkušební lokality umístěné ve vyšších polohách zemědělské výrobní oblasti řepařské a zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské