



Státní rostlinolékařská správa

Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6,

Oddělení diag laboratoře Olomouc

Referát monitoringu letu mšic Opava


Jaselská 16, 746 82 Opava, tel.: 553 631 225

Č.j. SRS 007545/2012

V Opavě 27.2.2012

Prognóza výskytu mšice makové v jarním období r. 2012

*Forecast of *Aphis fabae* incidence for spring in 2012*



Legenda (dle % brslenů osazených vajíčky):

Slabý výskyt méně než 40

Střední výskyt 40 – 60

Silný výskyt více než 60

 Bez výskytu  Slabý výskyt  Střední výskyt  Silný výskyt

Mšice maková (*Aphis fabae*) – Letová aktivita, tak jak jsme ji zaznamenali v sacích pastech, byla podprůměrná a to především na jaře. Kromě stanice Žatec, byla také podzimní migrace slabá. Odpočty zimních vajíček rovněž svědčí o slabém osazení brslenů, i když jak je patné z mapky, na Moravě jsou četná místa se středními nebo silnými výskyty. V Čechách pak převažují lokality neosazené nebo se slabými výskyty, ale i zde najdeme místa s brsleny silně osazenými vajíčky. Vajíčkům, zřejmě neuškodily ani velmi nízké teploty, které panovaly na přelomu ledna a února, proto je na jižní a střední Moravě riziko škodlivých výskytů vyšší.

Zpracoval: Ing. Svatopluk Rychlý