


Prognóza výskytu mšice makové v jarním období roku 2014
Forecast of Aphis fabae incidence for spring 2014



Legenda/ Legend

Bez výskytu
 Slabý výskyt (do 5 vajíček na pupen)
 Silný výskyt (nad 5 vajíček na pupen)
free from eggs *low incidence (up to 5 eggs per bud)* *strong incidence (over 5 eggs per bud)*

V souladu s loňskou prognózou byly jarní výskyty v roce 2013 podprůměrné. Záchyty v porostech cukrovky a máku se jeví jako lokální bez potřeby ošetření. Také podzimní migrace byla na většině stanic podprůměrná, pouze v Žatci byl zaznamenán nadprůměrný přelet.

Na území reprezentovaném sací pastí v Žatci je zaznamenáno silné osazení brslenů vajíčky, ale překvapivě i na jiných lokalitách, na Hané a na Ostravsku, na Jižní Moravě v jihovýchodních Čechách a v Polabí. Všude tam je **zvýšené riziko silných jarních výskytů**.

V posledních letech nejsou virové žloutenky cukrovky zásadním problémem, především proto, že jsou omezeny zdroje viróz a je dobře propracován systém insekticidního moření. Přesto je doporučováno sledovat aktuálně dynamiku přeletu mšic pro překlenutí období klesající účinnosti moření a dosažení fáze 16 pravých listů cukrovky, kdy klesá její citlivost k virovým chorobám.

Ing. Svatopluk Rychlý
REMOLEM Opava