


**Prognóza výskytu mšice zelné (*Brevicoryne brassicae*) v jarním období roku 2014**  
*Forecast of Brevicoryne brassicae incidence for spring 2014*



**Legenda/ Legend**

**Počet vajíček na 100 rostlin/ number of eggs per 100 plants**

- Bez výskytu /free from aphid eggs
- Slabý výskyt - méně než 5 vajíček /low incidence – up to 5 eggs
- Střední výskyt – 5 až 100 vajíček/middle incidence – from 5 to 100 eggs
- Silný výskyt – nad 100 vajíček/strong incidence - over 100 eggs

Na jaře roku 2013 vyslovená obava z časných silných výskytů, způsobených přezimujícími kmeny s neúplným generačním cyklem, se nevyplnila. Letová aktivita byla slabá v obou migračních vlnách. Výskyty v porostech byly jen lokální a častější na brukvovitě zelenině než na řepce.

Rovněž výskyty přezimujících vajíček jsou na většině území nulové nebo slabé, střední výskyt je zjištěn v okrese Tábor a dokonce silný v České Lípě a Žďáru nad Sázavou.

V těchto třech okresech je možné očekávat **vyšší výskyty** v jarních měsících. Na ostatním území je předpoklad **slabých výskytů**, který by mohl být změněn v případě **přezimování anholocyklických kmenů**. **Riziko**, že přečkaly letošní mírnou zimu, je, navzdory několika mrazivým periodám, **vysoké**.

Ing. Svatopluk Rychlý  
REMOLEM Opava