ČESKÁ REPUBLIKA
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Držitel certifikátu ISO 9001:2009

Národní odrůdový úřad

Nově registrované odrůdy
(srpen 2015)

Kukuřice

Agro Vitallo

Agro Vitallo je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 280 S).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB1231
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

Arvedo

Arvedo je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 320 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: EI4210
Udržovatel: Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Žatec

Cyrano

Cyrano je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: SL10271
Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen, Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Žatec

DKC3250

DKC3250 je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: EN3129
Udržovatel: Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o., Brno

DKC3941

DKC3941 je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 310 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: EM3915
Udržovatel: Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o., Brno

DS 1202B

DS1202B je tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: DS1202
Udržovatel: Dow AgroSciences GmbH, Německo

ES Brillant

ES Brillant je tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 300 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: ESZ2309
Udržovatel: Euralis Semences, Francie
Zástupce v ČR: EURALIS Saaten GmbH, Německo

ES Metronom

ES Metronom je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: ESZ2202
Udržovatel: Euralis Semences, Francie
Zástupce v ČR: EURALIS Saaten GmbH, Německo

ES Mikar

ES Mikar je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 300 S).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: ESZ2306
Udržovatel: Euralis Semences, Francie
Zástupce v ČR: EURALIS Saaten GmbH, Německo

Kroissans

Kroissans je tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S, 250 Z).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká, výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské a na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB1341
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

Kubitus

Kubitus je tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S).
Rostliny středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký, obsah škrobu vysoký až velmi vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká až velmi vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká až velmi vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: KXB2301
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

KWS 2323

KWS 2323 je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB2323
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

KWS 2370

KWS 2370 je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti 290 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna koňský zub.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB2370
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

KWS 3356

KWS 3356 je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 310 Z).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna koňský zub.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB3356
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

KWS Nestor

KWS Nestor je tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 240 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.
Předběžné označení: KXB2305
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

KWS Stabil

KWS Stabil je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 210 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.
Předběžné označení: KXB2101
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

LG30215

LG30215 je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.
Předběžné označení: LZM162/51
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice

LG30248

LG30248 je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S).
Rostliny středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: LZM162/73
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice

MAS 22K

MAS 22K je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 240 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.
Předběžné označení: MGM227729
Udržovatel: MAISADOUR SEMENCES, Francie

Matthew

Matthew je tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 280 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: LZM362/35
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice

Moscato

Moscato je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 300 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký, středně až méně odolný proti napadení mykózami palic.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: RH12062
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o., Praha

P8134

P8134 je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení:X80B443
Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, Německo
Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav
P8213

P8213 je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká až velmi vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení:X80B377
Udržovatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH, Německo
Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav

Panash

Panash je tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: MGM214134
Udržovatel: MAISADOUR SEMENCES, Francie

Quantico KWS

Quantico KWS je tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 280 S).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Hybrid je méně odolný proti napadení snětí kukuřičnou (Ustilago maydis).
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB2161
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

RGT Conexxion

RGT Conexxion je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 290 S, cca 310 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká až velmi vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká až velmi vysoká, výnos zrna vysoký, středně až méně odolný proti napadení mykózami palic.
Určen pro pěstování na siláž a na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: RH12065
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o., Praha

RGT Dublixx

RGT Dublixx je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 310 Z).
Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.
Výnos zrna vysoký, středně až méně odolný proti napadení mykózami palic.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: RH12057
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o., Praha

RGT Luxxida

RGT Luxxida je dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 330 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna koňský zub.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: RH12067
Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o., Praha

Rivaldinio KWS

Rivaldinio KWS je dvouliniový (Sc), raný až velmi raný hybrid (číslo ranosti 250 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: KXB1144
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

Sikaldi CS

Sikaldi CS je dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).
Rostliny středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: CSM1159
Udržovatel: Caussade Semences, Francie

Simpatico KWS

Simpatico KWS je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: KXB2143
Udržovatel: KWS SAAT SE, Německo
Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o., Velké Meziříčí

Staccato

Staccato je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 270 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna středně vysoký až vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: SL20111
Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen, Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Žatec

SY Karthoun

SY Karthoun je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 210 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos celkové zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: SA0472
Udržovatel: Syngenta France SAS, Francie
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Praha

SY Pracht

SY Pracht je dvouliniový (Sc), raný až velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 250 Z).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos zrna vysoký.
Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení: SB1521
Udržovatel: Syngenta France SAS, Francie
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Praha

SY Welas

SY Welas je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).
Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty vysoký až velmi vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: SA1432
Udržovatel: Syngenta France SAS, Francie
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Praha

Zafiro

Zafiro je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).
Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.
Výnos celkové suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost - ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost - IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.
Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské.
Předběžné označení: SL21187
Udržovatel: SAATBAU LINZ eGen, Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Žatec

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů																								
Hybrid			Výnos						Kvalita							Ranost		Další hospodářské vlastnosti						
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	IVDOM	DMS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palicí	Sněť kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Velmi raný sortiment - číslo ranosti do 230 (240)																								
SY Karthoun	2015	TM	101	106	103,6	95	100	98,1	35,6	71,3	77,3	70,4	47,5	6,55	105,8	88	32,2	8,0	7,6	0,3	0,1	251	89
Luxxo	2012	TM	96	98	97,4	90	96	93,3	31,1	70,5	76,5	69,9	48,8	6,48	98,4	90	31,8	8,0	7,9	0,1	0,1	259	92
Pirro	2012	TM	92	96	93,9	90	91	90,4	31,0	68,7	75,4	68,1	47,4	6,32	92,4	90	31,6	3,7	5,1	0,6	0,4	248	92
Ambrosini	2009	MZ	97	102	100,1	95	99	97,0	35,3	71,6	75,9	70,8	48,2	6,58	102,5	88	31,6	8,5	8,7	0,2	0,1	235	90
DKC3250	2015	M	100	102	101,5	97	100	98,6	34,7	72,0	77,0	70,9	48,5	6,61	104,4	90	31,4	8,2	8,4	0,5	0,1	249	89
SY Werena	2014	M	103	104	103,4	100	101	100,8	34,5	71,4	76,6	70,5	48,6	6,55	105,5	91	31,2	7,3	7,2	0,4	0,5	258	99
Kubitus	2015	TM	98	99	98,7	97	96	96,4	36,8	72,8	77,2	71,8	48,9	6,68	102,6	89	31,2	7,5	7,7	0,2	0,1	240	89
ES Techno	2014	M	99	89	93,3	95	90	92,0	35,5	72,0	77,0	71,3	48,9	6,62	96,2	90	31,1	9,0	9,0	0,1	0,0	238	84
LG30238	2011	TM	103	95	98,5	101	93	96,6	30,5	70,6	76,8	70,4	49,9	6,49	99,6	89	31,1	8,4	8,6	0,2	0,0	246	91
Ronaldinio	2007	M	97	100	99,0	94	100	97,4	36,5	72,3	77,4	71,6	48,5	6,64	102,3	87	31,1	8,3	8,2	0,5	0,0	233	86
Babexx	2014	M	93	101	97,8	96	95	95,5	34,8	72,2	77,3	71,6	49,5	6,63	100,9	88	31,0	6,3	7,0	0,5	0,1	246	96
LG30220	2013	TM	103	99	101,0	102	98	100,2	34,1	71,7	77,3	71,2	49,3	6,58	103,6	89	30,8	8,4	8,5	0,4	0,1	232	85
Tetraxx	2013	TM	97	101	99,2	97	100	98,6	28,2	68,3	75,1	67,9	48,3	6,29	97,1	90	30,7	8,9	8,8	0,3	0,3	257	89
LG30248	2015	TM	101	103	102,5	99	104	102,1	32,2	71,2	77,6	70,7	49,4	6,54	104,4	89	30,6	6,9	6,9	0,3	0,3	236	86
Gottardo KWS	2014	TM	95	100	97,5	96	97	96,9	34,9	71,7	76,7	71,0	48,5	6,59	100,0	90	30,5	7,1	7,4	0,3	0,2	239	87
DKC3340	2014	TM	96	96	95,7	96	95	95,6	32,2	71,0	76,5	70,3	48,9	6,53	97,2	91	30,5	8,5	8,7	0,1	0,0	237	92
Toninio	2013	TM	101	105	103,6	101	106	104,0	31,5	69,5	74,6	68,5	47,0	6,39	103,0	90	30,4	8,4	8,4	0,7	0,3	271	105
Panash	2015	TM	102	97	99,2	100	99	99,7	34,6	72,2	77,3	71,6	49,5	6,63	102,5	88	30,4	7,0	7,6	0,4	0,1	244	91
DS0419A	2013	TM	100	96	97,7	102	96	98,8	34,3	71,0	75,6	70,4	48,1	6,52	99,1	89	30,1	5,3	5,6	0,2	0,2	249	98
Prestoso	2014	TM	97	106	101,9	101	105	103,4	34,5	73,0	77,8	71,9	50,0	6,70	106,4	91	29,9	6,5	6,9	0,2	0,2	260	95
Alpino	2014	TM	100	103	101,5	104	104	103,7	32,2	69,7	75,9	69,4	48,3	6,41	101,3	91	29,8	7,2	7,7	0,2	0,1	244	100
Lakti CS	2009	MZ	97	100	98,8	101	101	101,3	30,2	70,1	75,3	69,2	48,4	6,43	99,0	90	29,6	7,7	8,0	0,3	0,0	258	101
Supreme	2012	MZ	97	98	97,7	101	101	101,1	29,9	67,6	73,5	67,1	46,3	6,22	94,7	92	29,4	6,8	7,1	0,2	0,0	256	100
PR39A98	2007	MZ	103	101	101,6	106	106	105,8	31,4	69,6	76,5	69,0	48,1	6,41	101,4	91	29,3	7,8	8,1	0,1	0,0	255	93
Zafiro	2015	M	99	104	101,7	103	110	106,7	33,9	71,2	75,8	70,3	48,6	6,54	103,6	91	29,2	6,8	7,3	0,3	0,1	269	100
Asteri CS	2007	M	105	106	105,6	109	113	111,4	31,6	68,3	74,4	67,9	46,4	6,29	103,4	91	28,9	7,0	7,1	0,1	0,0	257	101
Sikaldi CS	2015	TM	98	103	100,9	106	111	108,8	33,0	70,4	75,5	70,0	47,8	6,46	101,5	90	28,2	7,1	7,5	0,1	0,1	240	92
SL Enormo	2009	MZ	86	95	91,4	95	103	99,6	27,7	69,2	75,4	68,3	48,6	6,37	90,6	92	27,8	4,8	5,5	0,4	0,4	264	101
100% v t/ha			15,1	19,6	17,3	50,4	63,5	57,0															
100% v MJ/ha															111 346								
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:			9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev																			
	Typ zrna:			T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub																			
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																							

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů																							
Hybrid			Výnos						Kvalita							Ranost		Další hospodářské vlastnosti					
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	IVDOM	DMS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blízen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palicí	Sněť kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Raný sortiment - číslo ranosti 230 - 260																							
Ronaldinio	2007	M	101	98	99,4	94	93	93,6	36,3	71,7	76,9	71,2	48,2	6,59	101,7	85,5	32,9	8,0	8,5	0,1	0,3	240	90
Kopernikus	2013	TM	101	103	102,0	99	100	99,4	33,3	70,9	75,6	70,3	48,5	6,51	103,0	87,4	31,8	5,5	7,3	0,1	0,4	251	102
LG30274	2012	TM	104	101	102,1	102	98	99,7	30,1	70,6	76,5	70,6	50,4	6,49	102,8	87,8	31,6	7,2	7,8	0,4	0,6	250	101
Assano	2013	TM	93	98	95,5	88	99	94,3	32,2	69,7	75,1	69,1	47,6	6,41	95,1	89,3	31,6	5,0	6,3	0,0	0,2	258	104
Cyrano	2015	M	106	100	102,6	101	102	101,6	32,3	70,8	76,1	70,3	49,0	6,52	103,8	90,4	31,5	7,2	7,0	0,2	2,6	259	104
SY Welas	2015	M	105	106	105,8	103	106	104,6	34,4	70,5	75,5	69,7	47,1	6,48	106,3	91,4	31,4	8,2	8,1	0,0	0,1	252	111
ES Metronom	2015	TM	101	106	103,6	101	102	101,8	30,2	69,4	75,1	68,5	47,6	6,38	102,6	90,3	31,3	8,7	8,9	0,1	0,2	264	105
Figorinio	2012	T	99	105	101,9	99	103	101,5	30,6	68,8	74,4	68,1	47,1	6,33	100,1	89,5	31,0	6,0	7,3	0,2	0,2	271	115
ES Tarock	2014	M	101	98	99,2	98	100	99,2	31,6	71,0	76,3	70,4	49,8	6,53	100,5	88,4	31,0	9,0	8,8	0,0	0,1	246	97
Barros	2012	M	102	102	102,3	102	102	102,2	33,3	70,2	74,9	69,3	47,1	6,45	102,4	87,9	31,0	8,4	8,7	0,0	0,1	240	99
ES Convent	2014	TM	98	96	97,1	96	99	97,6	32,8	70,3	75,5	69,6	48,0	6,47	97,5	88,8	30,9	5,7	6,9	0,1	0,3	245	105
Dynamite	2012	TM	100	97	98,4	100	98	98,8	31,6	68,8	73,0	68,0	46,4	6,33	96,6	88,8	30,9	5,3	6,9	0,1	0,0	260	107
PR39A98	2007	MZ	100	97	98,0	100	97	98,4	32,5	70,0	76,2	69,3	47,7	6,44	97,9	89,8	30,8	8,7	8,7	0,0	0,1	256	99
Xxilo	2012	TM	100	97	98,4	101	98	99,2	29,5	69,0	74,1	68,1	48,1	6,34	96,8	90,0	30,7	8,0	8,2	0,1	0,1	260	108
Kroissans	2015	TM	100	99	99,4	100	100	100,3	34,9	71,4	76,2	70,8	48,6	6,56	101,3	87,7	30,7	7,0	7,8	0,2	0,6	242	99
Kawaxx	2014	TM	101	94	96,9	100	98	98,9	30,8	70,0	75,8	69,6	48,8	6,44	96,7	90,9	30,5	9,0	8,8	0,1	0,4	262	106
Volumixx	2014	TM	103	103	103,0	106	104	105,0	28,8	68,3	75,1	68,0	47,8	6,29	100,5	90,8	30,4	7,7	8,4	0,0	0,1	265	102
ES Newmilk	2008	TM	96	96	96,4	96	101	99,2	32,8	69,5	75,1	68,9	47,0	6,40	95,7	90,6	30,2	7,2	7,4	0,2	0,6	250	107
SL Magello	2009	MZ	93	103	98,8	95	107	102,1	30,3	69,0	75,0	68,3	47,6	6,35	97,4	89,8	30,1	3,8	6,2	0,2	0,8	258	109
DS1202B	2015	TM	99	101	100,0	103	104	103,8	32,9	71,2	75,9	70,4	48,8	6,53	101,3	88,8	29,8	6,3	8,0	0,1	0,8	251	98
Simpatico KWS	2015	MZ	104	103	103,4	106	108	107,4	30,4	69,7	75,8	68,9	47,9	6,40	102,7	91,9	29,8	8,2	7,3	0,1	0,1	275	119
Tifosi CS	2011	TM	99	98	98,1	104	102	102,5	30,2	68,9	74,9	68,7	48,2	6,35	96,7	90,0	29,7	6,9	8,2	0,0	0,2	250	100
Koronias	2014	M	98	102	100,3	102	111	107,3	29,2	69,5	75,8	69,0	48,5	6,39	99,5	92,5	29,0	8,7	8,5	0,0	0,7	271	113
P8464	2014	MZ	99	100	99,9	104	109	106,7	30,7	70,9	76,6	70,3	49,9	6,52	101,1	92,0	29,0	9,0	8,2	0,0	0,2	259	103
ES Archimedes	2008	M	93	102	97,9	101	109	105,3	29,1	68,9	74,9	68,2	47,8	6,35	96,4	89,8	28,7	4,0	6,1	0,0	0,2	265	109
PR38Y34	2010	TM	99	102	100,9	107	114	111,0	29,1	67,9	74,6	67,3	46,9	6,25	97,9	90,9	28,2	8,5	8,0	0,1	0,0	257	104
Subito	2007	TM	100	99	99,1	112	109	110,1	27,4	68,4	74,6	68,1	48,5	6,31	97,0	92,4	27,9	8,0	8,2	0,1	0,4	257	117
100% v t/ha			16,3	21,2	18,8	53,4	68,5	60,9															
100% v MJ/ha															120 878								
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev																				
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub																				
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																							

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů																								
Hybrid			Výnos						Kvalita							Ranost		Další hospodářské vlastnosti						
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	IVDOM	DMS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palicí	Snět kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Středně raný sortiment - číslo ranosti 260 - 300																								
Fernandez	2010	MZ	105	107	106,0	100	99	99,6	34,9	69,7	75,3	69,2	46,1	6,40	106,9	85	33,3	8,8	7,6	0,7	2,9	301	127
P8213	2015	T	99	99	99,1	94	96	95,3	33,5	68,9	75,0	68,5	46,4	6,33	98,8	85	32,7	7,7	5,9	1,0	1,4	278	116
Sumaris	2008	M	98	100	98,9	95	97	96,3	33,8	67,8	73,7	67,3	44,8	6,23	97,1	85	32,2	8,9	8,1	0,6	2,6	279	134
Matthew	2015	TM	105	106	105,4	103	102	102,4	33,4	68,4	73,6	68,3	46,3	6,28	104,3	86	32,2	8,3	8,0	1,0	0,1	278	128
LG30275	2011	M	103	100	101,6	102	97	99,5	31,5	68,9	74,5	68,8	47,0	6,34	101,5	84	32,1	9,0	8,4	1,0	0,9	281	122
SY Campona	2014	TM	99	104	101,7	98	102	99,9	30,0	69,6	74,8	69,1	48,1	6,39	102,4	83	31,9	6,9	4,7	0,2	0,7	283	114
Agro Vitallo	2015	TM	94	104	99,2	95	100	97,7	31,0	68,1	73,8	67,9	46,8	6,26	97,8	85	31,7	6,2	4,4	0,5	3,2	294	116
Quantico KWS	2015	TM	100	100	100,0	102	98	99,5	32,1	68,9	73,9	68,4	47,0	6,33	99,8	84	31,5	8,1	7,7	1,4	4,5	292	131
Kabatis	2014	M	102	102	101,6	103	101	102,1	35,0	69,9	74,6	69,0	46,2	6,41	102,7	84	31,1	9,0	8,9	0,9	1,1	268	118
ES Fireball	2013	M	102	98	99,9	101	100	100,6	32,2	68,8	74,1	67,9	46,1	6,32	99,5	86	31,1	7,4	5,8	0,7	1,2	280	126
Edico	2013	TM	98	101	99,8	101	101	100,6	30,4	66,4	72,2	65,5	44,0	6,10	95,9	86	31,1	9,0	8,2	0,1	0,9	281	116
MAS 28A	2013	TM	101	102	101,3	105	100	102,6	32,8	67,2	72,3	66,4	44,2	6,17	98,5	85	30,9	8,6	7,7	0,4	0,3	290	118
Koblens	2012	TM	98	97	97,8	99	100	99,2	35,5	69,9	74,6	69,1	45,9	6,42	98,9	84	30,9	8,8	8,5	0,4	0,3	258	113
Indexx	2011	TM	93	100	96,3	94	103	98,5	34,7	69,9	74,1	69,2	46,8	6,43	97,5	84	30,7	7,8	6,1	0,6	0,4	286	128
Galvani CS	2011	M	95	103	99,1	98	104	101,2	30,0	66,9	72,3	66,9	46,4	6,16	96,1	85	30,7	8,8	8,1	0,6	0,9	277	118
RGT Conexxion	2015	M	99	100	99,5	101	103	102,1	35,2	70,1	74,7	69,5	46,9	6,43	100,9	87	30,5	9,0	8,2	0,4	0,6	278	117
Seiddi	2007	M	101	99	100,1	104	104	104,0	31,3	66,9	72,6	66,5	44,9	6,16	97,2	85	30,1	8,7	8,5	0,5	0,8	272	118
Corioli CS	2013	T	102	101	101,4	108	104	105,7	33,6	68,9	74,0	68,6	46,0	6,34	101,3	85	30,1	9,0	7,7	0,2	0,3	286	116
Atletico	2007	TM	99	97	98,3	104	101	102,6	30,7	67,1	73,5	67,0	46,1	6,17	95,7	84	30,0	8,0	6,7	0,8	1,9	286	129
ES Sigma	2011	M	98	96	96,9	101	102	101,2	31,3	68,0	73,9	67,8	46,3	6,26	95,5	85	30,0	8,9	8,4	0,3	0,4	278	118
Biriati CS	2011	TM	98	102	100,2	105	106	105,2	31,3	68,2	72,4	67,3	46,0	6,27	99,1	86	29,9	8,8	7,9	0,7	0,4	283	116
ES Mikar	2015	M	101	102	101,6	107	106	106,5	28,9	67,7	74,2	67,3	47,2	6,23	99,6	86	29,9	9,0	8,5	0,3	0,5	281	121
Futurixx	2011	MZ	100	100	99,8	107	106	106,3	34,0	68,9	74,0	68,3	46,0	6,33	99,5	88	29,3	8,9	7,7	0,3	0,3	278	126
100% v t/ha			19,3	20,4	19,8	62,1	64,5	63,3															
100% v MJ/ha															125 752								
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev																				
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub																				
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																							

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na siláž - významné hospodářské vlastnosti hybridů																							
Hybrid			Výnos						Kvalita							Ranost		Další hospodářské vlastnosti					
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos celkové suché hmoty			Výnos celkové zelené hmoty			Obsah škrobu	ELOS	IVDOM	DMS	Dinag	NEL	NEL (výnos)	Doba do květu blizen	Sušina celkové zelené hmoty při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Zlomené rostliny pod palicí	Sněť kukuřice	Výška rostlin	Výška nasazení palic
Jednotka			(%)			(%)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Středně pozdní sortiment - číslo ranosti nad 300																							
Pesandor	2011	MZ	102	107	104,7	97	102	99,5	33,1	68,4	73,0	67,7	45,1	6,3	104,5	85	33,8	7,4	6,8	0,7	0,7	264	117
Rivoxx	2013	MZ	97	101	98,7	97	95	96,3	34,9	69,9	74,6	69,7	47,2	6,4	100,6	85	33,0	7,1	6,9	1,1	0,4	279	116
Atletico	2007	TM	100	100	99,8	99	96	97,4	31,3	68,4	74,0	68,6	47,0	6,3	99,6	82	32,9	7,5	7,1	1,5	2,2	280	123
Exxotika	2014	MZ	102	100	100,7	101	97	98,7	33,9	68,8	73,4	68,6	46,2	6,3	101,2	85	32,8	7,9	7,7	0,2	0,4	281	115
Kaifus	2008	MZ	97	101	99,1	96	100	97,7	33,1	69,1	73,4	68,1	45,6	6,3	100,0	85	32,5	5,7	4,7	1,3	1,5	271	112
LG30311	2012	TM	103	99	100,8	104	99	101,4	27,0	67,9	73,4	67,5	47,4	6,2	100,1	82	31,9	8,4	7,9	0,5	1,4	270	108
RGT Luxxida	2015	Z	100	99	99,6	100	102	100,8	31,4	68,6	73,0	68,7	47,5	6,0	94,9	86	31,7	8,0	7,8	0,7	2,8	278	122
Futurixx	2011	MZ	99	92	95,4	103	100	101,4	32,2	68,6	73,4	68,1	46,2	6,3	95,5	87	30,3	7,4	6,5	0,4	0,3	268	119
Codiscan	2013	M	90	96	93,0	97	103	100,0	29,3	67,0	72,1	66,5	45,5	6,2	91,0	87	29,9	4,4	3,6	2,3	0,7	281	124
100% v t/ha			17,6	18,7	18,2	53,6	59,7	56,6															
100% v MJ/ha															111 346								
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:			9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev																			
	Typ zrna:			T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub																			
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (sušiny celkové zelené hmoty při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																							

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů																	
Hybrid			Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky							
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zrn	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Sněť kukuřice	Mykózy palic	Zavíječ kukuřičný (palice)	Zlomené rostliny pod palicí	Výška rostlin	Výška nasazení palice
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Velmi raný sortiment - číslo ranosti do 250																	
KWS Stabil	2015	M	102	103	102,4	98	337	86	27,5	6,0	8,2	0,0	6,7	1,0	2,4	290	127
Panash	2015	TM	95	95	94,8	95	351	84	28,4	8,3	8,8	0,1	9,9	1,3	0,4	273	109
ES Eurojet	2014	T	99	101	100,1	98	387	85	28,4	7,0	7,9	0,3	13,6	1,1	1,0	285	128
Silvinio	2011	TM	96	99	97,5	100	336	84	29,0	6,3	6,7	0,3	12,5	1,3	1,2	270	115
Wifaxx	2012	M	102	94	97,9	101	369	84	29,3	8,0	8,8	0,2	44,5	0,9	0,8	263	97
Arturo	2014	TM	97	101	99,4	97	324	88	29,3	7,3	8,6	0,1	8,5	0,0	3,6	299	124
LG30215	2015	TM	104	100	101,6	98	348	85	29,5	6,0	8,0	0,2	10,6	2,7	0,5	280	116
LG30217	2012	M	98	101	99,4	99	330	87	30,2	8,3	8,9	0,2	14,1	0,7	0,6	296	124
MAS 20T	2014	TM	97	101	99,1	97	324	88	30,3	7,7	8,9	0,1	21,9	1,1	0,6	280	115
KWS Nestor	2015	TM	102	106	104,3	99	385	85	30,4	6,7	7,9	0,6	15,5	1,4	0,7	275	112
Ricardinio	2010	M	106	104	105,0	100	345	85	30,9	7,7	8,9	0,2	9,9	1,3	0,7	287	119
Rebecca	2009	MZ	101	102	101,8	99	339	86	30,9	8,3	8,7	0,3	4,2	1,0	0,4	280	112
MAS 22K	2015	TM	102	103	102,9	98	382	86	31,0	9,0	9,0	0,1	18,9	0,5	0,1	282	105
Isotto	2014	M	104	101	102,4	99	343	87	31,1	7,0	7,9	0,1	9,2	0,3	1,0	270	120
Ceskor	2010	M	94	98	96,2	100	309	86	31,2	6,7	8,2	0,3	14,4	1,3	1,1	250	94
Zidane	2008	TM	101	102	101,6	100	386	82	31,5	6,7	8,6	0,5	19,3	1,9	0,5	268	103
P8000	2010	M	94	103	98,9	101	310	87	31,5	6,7	6,5	0,4	12,8	1,5	4,5	277	120
Lavena	2008	TM	93	101	97,4	101	357	87	32,9	8,3	8,7	0,3	30,1	0,9	0,2	282	111
Sixxtus	2011	MZ	90	106	98,9	100	341	90	33,3	7,7	8,8	0,4	10,8	0,8	1,0	277	124
Cesexo	2011	M	105	95	99,9	100	294	86	33,4	7,7	8,9	0,4	14,9	0,6	0,4	243	79
100% v t/ha			11,9	13,6	12,7	76,7											
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev														
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub														
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																	

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů																		
Hybrid			Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky								
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zrn	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Sněť kukuřice	Mykózy palic	Zavíječ kukuřičný (palice)	Zlomené rostliny pod palicí	Výška rostlin	Výška nasazení palice
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Raný sortiment - číslo ranosti 250 - 300																		
Kaduras	2013	M	98	99	98,8	99	351	88	28,9	7,7	8,2	0,3	13,9	1,7	0,7	271	111
Rivaldinio KWS	2015	TM	109	102	105,1	100	325	86	29,0	6,7	7,3	0,3	21,1	2,9	0,6	277	113
SY Pracht	2015	M	104	101	102,1	100	333	87	29,1	8,3	7,4	0,2	15,0	2,5	1,8	279	118
ES Cockpit	2013	TM	99	104	102,1	100	315	88	29,6	8,0	8,5	0,2	28,0	0,9	2,3	289	123
ES Concord	2014	M	98	100	99,0	101	316	88	29,7	5,3	7,0	0,1	18,8	3,4	1,5	280	118
Luigi CS	2011	TM	94	99	96,8	98	317	86	29,7	6,3	7,4	0,1	20,0	0,8	1,5	256	112
Danubio	2012	TM	100	102	101,0	100	373	88	29,9	6,7	7,5	0,1	16,9	2,7	0,8	292	120
Cevilar	2014	MZ	105	101	102,6	100	309	86	30,1	8,0	8,7	0,3	17,0	3,4	1,9	254	94
Millesim	2013	TM	108	103	105,3	101	363	84	30,2	8,0	8,0	0,5	20,2	2,1	1,7	262	100
Clovis	2014	MZ	98	102	100,4	100	325	88	30,3	8,3	8,0	0,4	14,0	2,6	2,3	264	115
DKC3711	2012	MZ	98	98	98,1	99	346	88	30,4	5,3	6,7	0,3	17,5	2,0	1,4	262	109
Zidane	2008	TM	97	97	96,9	100	381	82	30,5	6,0	6,9	0,2	23,8	2,9	0,9	265	98
Amamonte	2012	TM	100	101	100,5	100	364	84	30,6	7,3	7,4	0,3	34,8	3,7	2,1	281	112
Laperi CS	2013	TM	101	96	98,8	99	321	87	30,7	8,3	8,2	0,3	19,7	4,0	0,5	256	106
KWS 2323	2015	M	100	107	103,7	99	326	90	30,8	7,0	7,9	0,2	9,4	1,9	1,0	273	114
Kalupas	2013	MZ	106	103	104,5	99	333	88	31,1	8,0	8,4	0,1	17,5	2,3	2,3	276	117
LG30273	2014	M	104	101	102,6	99	337	88	31,1	8,0	8,2	0,1	16,0	2,7	1,0	283	119
Kroissans	2015	TM	102	106	104,4	101	359	85	31,1	7,0	7,9	0,4	20,5	4,2	2,5	260	109
Sixxtus	2011	MZ	98	104	100,9	100	352	89	31,2	7,7	8,4	0,2	16,1	0,7	1,6	277	119
Amelior	2007	TM	103	95	98,8	101	305	86	31,3	8,7	8,9	0,2	23,9	3,2	0,6	271	103
Staccato	2015	M	95	102	98,7	100	365	88	31,4	7,0	8,0	0,5	19,7	2,9	1,8	280	120
ES Metronom	2015	TM	101	104	103,0	101	350	87	31,5	7,7	8,2	0,4	45,4	3,9	1,1	284	116
DS0471B	2013	MZ	98	107	102,9	101	300	90	31,5	6,3	5,8	0,1	13,1	3,9	2,3	268	115
Pomeri CS	2013	T	102	98	100,1	100	310	88	31,5	8,3	8,3	0,2	22,0	2,2	0,7	282	117
P8134	2015	MZ	107	105	106,1	101	318	89	32,2	7,0	8,0	0,2	14,6	2,9	1,4	273	126
Fidoxxi	2014	TM	102	103	102,6	100	350	88	32,2	8,3	9,0	0,1	16,4	2,8	0,5	266	109
Conbrio	2013	M	97	97	96,8	100	331	89	32,7	7,3	7,0	0,5	18,9	4,0	3,6	267	115
Adevey	2011	M	104	103	103,4	100	369	87	32,8	7,0	8,5	0,0	22,8	1,9	1,1	286	120
Electrixx	2012	Z	90	104	97,5	99	334	90	33,0	7,3	7,9	0,3	13,6	3,5	1,4	272	108
Maxxens	2013	M	91	99	95,1	99	313	89	33,2	7,3	8,0	0,3	19,4	2,7	1,4	271	114
Cegrand	2013	M	99	101	99,9	99	318	89	34,4	8,0	8,7	0,3	16,0	3,3	0,4	259	101
100% v t/ha			11,4	13,4	12,4	76,5											
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev														
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub														
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																	

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů																		
Hybrid			Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky								
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zrn	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Sněť kukuřice	Mykózy palic	Zavíječ kukuřičný (palice)	Zlomené rostliny pod palicí	Výška rostlin	Výška nasazení palice
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Středně raný sortiment - číslo ranosti 300 - 350																		
Celunar	2014	M	100	95	97,0	100	330	80	25,5	7,7	7,3	0,2	34,2	5,0	1,5	270	104
Kleonars	2014	M	99	100	100,0	98	311	84	26,5	8,0	8,5	0,3	30,2	0,8	0,9	259	117
P8464	2014	MZ	103	100	100,9	101	270	82	26,6	6,5	7,0	0,3	24,0	2,3	1,0	270	110
KWS 2370	2015	Z	114	99	105,4	102	343	83	26,6	8,7	8,9	0,4	23,1	1,3	1,8	279	117
ES Garant	2011	M	104	101	102,1	102	313	84	26,8	7,8	8,5	1,2	45,6	2,7	0,8	274	128
Moscato	2015	M	102	105	103,8	101	324	85	27,1	7,9	7,9	0,3	37,7	1,5	0,7	264	107
Krysalis	2013	M	95	102	99,3	99	303	84	27,2	7,7	7,8	0,2	26,5	1,5	1,2	262	111
Oscarro	2014	MZ	111	105	107,6	98	338	85	27,2	7,7	8,0	0,9	31,7	1,5	0,7	260	109
LG30290	2011	MZ	91	99	95,4	100	315	85	27,3	6,0	6,9	0,8	40,4	2,7	1,2	269	116
Amelior	2007	TM	102	92	95,8	101	323	80	27,4	8,3	8,4	0,2	26,9	0,4	0,9	262	101
ES Brillant	2015	TM	102	108	105,4	101	310	84	27,5	7,7	8,2	0,8	23,3	0,8	1,5	277	126
KWS 9361	2012	M	109	104	106,0	98	307	84	27,5	7,7	7,2	0,4	28,8	1,5	0,6	262	103
Konkretis	2012	M	96	101	98,7	98	304	83	27,6	7,9	7,9	1,1	29,2	1,3	1,9	271	113
Electrixx	2012	Z	98	101	100,0	99	323	85	27,8	7,4	7,4	0,1	30,2	1,3	1,2	264	110
ES Gallery	2014	MZ	106	106	106,0	100	300	85	27,8	8,0	8,7	0,4	9,8	1,3	1,8	267	123
DKC3830	2013	MZ	95	101	98,5	100	340	85	27,8	7,2	7,9	1,6	42,9	1,5	1,7	263	112
RGT Conexxion	2015	M	108	106	107,1	101	377	85	28,1	8,2	8,7	0,6	38,3	3,5	0,5	267	113
Kluni CS	2010	M	109	92	99,4	99	298	80	28,2	7,9	7,3	0,4	26,5	1,7	0,7	234	102
KWS 3356	2015	Z	111	104	106,9	102	316	83	28,5	9,0	9,0	0,3	18,5	1,7	1,0	259	108
RGT Dublixx	2015	Z	102	103	102,6	100	353	84	28,7	8,0	8,1	0,6	35,0	2,9	1,3	282	112
DKC3941	2015	M	94	107	101,6	100	323	86	28,7	7,0	7,9	1,0	32,9	2,1	5,3	263	115
Axxys	2014	MZ	102	104	103,1	101	336	84	29,3	7,7	8,1	0,3	21,0	3,1	3,4	268	112
Arvedo	2015	MZ	102	102	102,0	100	329	85	29,7	8,0	8,1	0,4	18,5	2,9	0,5	262	107
Quincey	2014	TM	97	106	102,5	102	380	83	29,7	6,4	6,4	1,5	42,7	1,9	0,6	267	117
Surreal	2011	M	106	107	106,6	102	335	84	29,9	7,5	7,9	0,8	29,0	2,9	0,8	254	109
Ferarixx	2013	M	98	106	102,4	100	327	86	30,0	7,2	7,9	0,4	29,4	3,1	1,9	263	115
Fisixx	2011	MZ	105	104	104,6	100	350	84	30,2	7,7	7,5	0,8	32,1	1,5	1,2	262	110
Futurixx	2011	MZ	105	105	104,8	99	327	86	30,9	7,2	7,8	0,1	21,7	2,1	0,9	270	121
Susann	2010	TM	102	99	100,4	102	336	81	31,0	7,0	7,3	0,1	22,7	0,8	1,0	263	108
Ceben	2010	M	96	93	94,0	99	348	86	32,0	7,8	8,4	0,2	32,3	1,1	1,3	235	110
100% v t/ha						76,6											
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev														
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zu														
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																	

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY
Kukuřice na siláž, 2013 - 2014

Kukuřice na zrno - významné hospodářské vlastnosti hybridů																	
Hybrid			Výnos			Kvalita		Ranost		Další hospodářské znaky							
Znak	Registrace	Typ zrna	Výnos zrna			Obsah škrobu	Hmotnost tisíce zrn	Doba do květu blizen	Vlhkost zrna při sklizni	Poléhání	Poléhání před sklizní	Snět kukuřice	Mykózy palic	Zavíječ kukuřičný (palice)	Zlomené rostliny pod palicí	Výška rostlin	Výška nasazení palice
Jednotka			(%)			(%)	(g)	(dny)	(%)	(9-1)	(9-1)	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm)	(cm)
Rok			2013	2014	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
Středně pozdní sortiment - číslo ranosti nad 350																	
P8609	2013	M	94	96	94,9	101	273	82	22,9	0,0	9,0	0,5	27,8	2,7	2,5	264	118
Ferarixx	2013	M	88	104	97,4	100	332	84	26,0	0,0	9,0	0,4	26,4	2,0	4,8	266	115
Kerberos	2012	MZ	92	106	100,1	101	315	82	26,3	0,0	8,3	0,5	29,2	4,0	3,7	266	126
Kompetas	2014	Z	107	96	100,9	101	309	85	26,3	0,0	8,3	1,7	13,8	0,6	1,3	268	126
Futurixx	2011	MZ	103	103	103,2	100	322	84	26,4	0,0	8,3	0,3	19,7	2,6	3,3	274	118
P9494	2011	Z	100	101	100,4	102	321	82	26,6	0,0	9,0	2,1	41,3	3,5	2,2	258	110
Kassandras	2013	Z	98	103	100,8	101	318	83	27,5	0,0	5,7	0,8	22,5	0,6	1,0	283	122
Memoxx	2011	Z	100	103	101,8	100	345	84	27,6	0,0	8,3	0,6	20,7	0,4	1,1	275	124
KWS 6471	2009	M	97	95	96,1	99	318	84	27,7	0,0	3,0	0,6	26,2	5,0	1,9	267	119
RGT Axxilin	2014	Z	102	107	104,8	100	312	84	27,8	0,0	7,7	4,1	17,9	3,2	2,4	259	117
KWS 2376	2007	Z	106	100	102,2	99	333	83	28,2	0,0	4,3	0,4	35,3	0,3	0,6	261	118
Milanno	2013	M	100	101	100,3	99	291	85	28,6	0,0	9,0	0,4	23,4	2,1	1,2	263	113
100% v t/ha			8,3	12,6	10,4	75,6											
Vysvětlivky:	Hodnocení 9-1:		9 = nejlepší projev, 1 = nejhorší projev														
	Typ zrna:		T-tvrdý typ, TM-tvrdý až mezityp, M-mezityp, MZ-mezityp až koňský zub, Z-koňský zub														
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizni) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.																	