



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: [jana.ondrackova@ukzuz.cz](mailto:jana.ondrackova@ukzuz.cz)

Datum: 6. 10. 2016

č.j. : UKZUZ 109652/2016

**PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016**

**1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN**

**Dafne 250 EC (+ další obchodní jméno Rekin 250 EC)**

držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,  
Polsko

evidenční číslo: 5274-1

účinná látka: difenokonazol 250 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019

*Rozsah povoleného použití:*

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň	strupovitost jabloně, padlí jabloňové	0,2 l/ha	28	2) při prvních příznacích choroby	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jabloň	750 l vody /ha	postřik, rosení	max. 3x	10-14 dnů (strupovitost) 7-14 dnů (padlí)

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
jabloň	25	16	12	6

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $< 25$  m.

## Faxer

držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgie

evidenční číslo: 5179-0

účinná látka: prochloraz 450 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2022

### Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice, žito, tritikale	stéblolam	1 l/ha	35	1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH	
pšenice, žito, tritikale	braničnatka pšeničná	1 l/ha	35	1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale	150-500 l/ha	postřik	1x

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
pšenice, žito, tritikale	nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu
pšenice, žito, tritikale	nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelství materiál u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Citlivost odrůd pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

### Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
obilniny, jarní aplikace	8	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

### Funguran progress

držitel rozhodnutí o povolení: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18b, D-20097 Hamburg, Germany

evidenční číslo: 5336-0

účinná látka: hydroxid měďnatý 537 g/kg (350 g/kg mědi)

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019

#### Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
chmel	plíseň chmelová	2,4-5,4 kg/ha	7	1) od: 37 BBCH, do: 89 BBCH	
réva	plíseň révová	1 kg/ha do BBCH 61 2 kg/ha od BBCH 61	21	1) od: 11 BBCH, do: 81 BBCH	
jádroviny	strupovitost	1,8 kg/ha (0,3-0,6 kg/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) před květem 2) podle signalizace	4) max. 4x za rok
jádroviny	strupovitost	1,8 kg/ha (0,3-0,6 kg/1 m výšky koruny/ha)	14	1) od: 74 BBCH 2) podle signalizace	4) max. 3x za rok
jádroviny	nektriová rakovina	3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) po sklizni 2) při zjištění výskytu	4) max. 3x za rok
peckoviny	suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně	3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) před květem 2) při zjištění výskytu	
peckoviny	suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně	3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) po sklizni	
brambor	plíseň bramborová	2 kg/ha	14	2) podle signalizace	
brambor	černání stonku bramboru (Erwinia carotovora)	0,009 kg/100 kg max. 100 l vody/ha (0,252 kg/ha)	AT	1) před výsadbou, při výsadbě	4) výsadba max. 2800 kg/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	400 l/ha	postřik	4x	7-10 dnů
chmel	1200-2700 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-14 dnů
jádroviny	500-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	4x za rok	7-10 dnů, u aplikace po sklizni 21 dnů
peckoviny	500-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	3x za rok	7-10 dnů
réva	400-1600 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	4x za rok	8-12 dnů

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele:

BBCH 37-55 1200-1500 l/ha

od BBCH 55 2000-2700 l/ha

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Při použití přípravku v jádrovinách nelze u citlivých odrůd vyloučit výskyt rzivosti plodů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů [m]				
jádroviny, peckoviny, chmel, réva, brambor	50	50	50	20
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
peckoviny, chmel	10	5	0	0
jádroviny	10	0	0	0

## Next

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie

evidenční číslo: 5319-0

účinná látka: trinexapak-ethyl 250 g/l

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019

### Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,4 l/ha	AT	1) od 30 BBCH, do 39 BBCH	
ječmen ozimý	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,8 l/ha	AT	1) od 30 BBCH, do 39 BBCH	
ječmen jarní	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,5 l/ha	AT	1) od 30 BBCH, do 37 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen	200-400 l/ha	postřik	1x
pšenice	200-400 l/ha	postřik	1x

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte na mokry porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Okamžitě po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

## Prochlorus

držitel rozhodnutí o povolení: Sociétés Financière de Pontarlier, "Villa Celony", 1175, Montée d'Avignon, 13090 Aix en Provence, Francie

evidenční číslo: 5172-0

účinná látka: prochloraz 450 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2022

### Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice, žito, tritikale	stéblolam	1 l/ha	35	1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH	
pšenice, žito, tritikale	braničnatka pšeničná	1 l/ha	35	1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale	150-500 l/ha	postřik	1x

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
pšenice, žito, tritikale	nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu
pšenice, žito, tritikale	nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelský materiál u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení.

Citlivost odrůd pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
obilniny, jarní aplikace	8	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

## Tarzec

držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o., Na okraji 1305/14, 162 00 Praha 6

evidenční číslo: 5345-0

účinná látka: halauxifen-methyl (XDE-729 methyl) 7,8 g/l

platnost povolení končí dne: 5. 8. 2026

### Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevele dvouděložné jednoleté	0,6-1 l/ha	AT	1) od: 11 BBCH, na podzim 2) postemergentně	
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	plevele dvouděložné jednoleté	0,4-0,8 l/ha	AT	1) od: 13 BBCH, do: 45 BBCH, na jaře 2) postemergentně	
pšenice jarní, ječmen jarní, tritikale jarní	plevele dvouděložné jednoleté	0,4-0,8 l/ha	AT	1) od: 13 BBCH, do: 45 BBCH 2) postemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice, ječmen, žito, tritikale	100-400 l/ha	postřik	1x na podzim, 1x na jaře	3 měsíce od podzimní aplikace

Přípravek lze použít během jedné sezóny v ozimých obilninách na podzim i na jaře.

Celková dávka přípravku nesmí překročit dávku 1,8 l/ha v plodině.

Odstup mezi aplikacemi musí být minimálně 3 měsíce.

### Spektrum plevelů v závislosti na dávce a termínu aplikace:

#### **Ozimé obilniny – podzimní termín aplikace:**

**Citlivé plevely k dávce 0,6 l/ha:** hluchavka nachová (do 4 cm výšky), kakost maličká (do 5 pravých listů), zemědělm lékařský (do 2 pravých listů).

**Citlivé plevely k dávce 0,8 l/ha:** svízel přítula (do 40 cm délky lodyhy)

**Citlivé plevely k dávce 1,0 l/ha:** chrpa modrák a ptačinec žabinec (do 10 cm výšky), mák vlčí (do 8 cm výšky), rozrazil břečťanolistý (do 4 pravých listů) a rozrazil perský (do 2 pravých listů).

### **Ozimé obilniny – jarní termín aplikace:**

**Citlivé plevele k dávce 0,4 l/ha:** hluchavka nachová (do 20 cm výšky), kakost maličká (do 15 cm výšky), merlík bílý (do 7 cm výšky).

**Citlivé plevele k dávce 0,6 l/ha:** zemědým lékařský (do 15 cm výšky), svízel přítula (do 80 cm délky lodyhy)

**Citlivé plevele k dávce 0,8 l/ha:** konopice polní (do 10 cm výšky), mák vlčí (do 12 cm výšky)

### **Jarní obilniny:**

**Citlivé plevele k dávce 0,4 l/ha:** hluchavka nachová (do 4 cm výšky), konopice polní (do 8 cm výšky), merlík bílý (do 35 cm výšky), zemědým lékařský (do 25 cm výšky)

**Citlivé plevele k dávce 0,6 l/ha:** svízel přítula (do 20 cm délky lodyhy)

**Citlivé plevele k dávce 0,8 l/ha:** ptačinec žabinec (do 13 cm výšky), pohanka svlačcovitá (do 3 cm výšky)

Na jaře lze přípravkem ošetřovat při teplotách do 25 °C.

Nelze vyloučit projevy fytoxicity na ošetřovaných plodinách.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

### Následné plodiny:

Po podzimní aplikaci přípravku v dávce 1,0 l/ha není pěstování následných plodin po sklizni ošetřené obilniny omezeno.

Po jarní aplikaci přípravku v dávce 0,8 l/ha v termínu max. BBCH 45, nebo po podzimní aplikaci v dávce 1,0 l/ha, po které následuje opětovné jarní použití přípravku v dávce 0,8 l/ha, není pěstování následných plodin po sklizni ošetřené obilniny omezeno.

Před pěstováním následné plodiny v tomtéž vegetačním období proveďte orbu.

### Náhradní plodiny

V případě podzimního termínu použití přípravku a vyzimování plodiny lze na jaře bez kultivačního omezení vyset jarní pšenici, jarní ječmen, kukuřici, jarní řepku, hrách setý, fazole, slunečnici.

V případě jarního termínu použití přípravku a nutnosti vyset náhradní plodinu, lze na jaře bez kultivačního omezení po 1 měsíci od aplikace vyset jarní pšenici, jarní ječmen, kukuřici, jarní řepku, hrách setý, fazole. S odstupem 2 měsíců lze po orbě vyset slunečnici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

### Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi halauxifen-methylu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

a) Po vypuštění nádrže vyplachujte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.

b) Naplňte nádrž čistou vodou a přidejte čisticí prostředek dle návodu na jeho použití. Tímto roztokem propláchněte ramena a trysky, a poté vystříkejte.



- c) Opakujte postup podle bodu "b" ještě jednou  
d) Trysky a sítká musejí být čištěny odděleně. K odstranění stop čistícího přípravku vypláchněte důkladně nádrž čistou vodou, a propláchněte ramena i trysky.  
e) Trysky a sítká musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé	6	4	4	4
ječmen jarní, pšenice jarní, tritikale jarní	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
ječmen, pšenice, tritikale, žito	5	5	0	0

Ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Ječmen jarní, pšenice jarní, tritikale jarní:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

## **2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO ÚŘEDNÍHO REGISTRU**

- rozhodnutí nebyla vydána

## **3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU**

### **Cuprocaffaro Micro**

držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153  
Miláno, Itálie

evidenční číslo: 4624-0

účinná látka: oxichlorid měďnatý 657,9 g/kg  
(obsah čisté mědi 375 g/kg)

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019

*Rozsah povoleného použití:*

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň révová	1,3 kg/ha do BBCH 61, 2,67 kg/ha od BBCH 61	21/7	3) OL-21 dnů hrozny moštové, 7 dnů hrozny stolní	
chmel	plíseň chmelová	3,5-5,3 kg/ha	7		

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
chmel	1000-1500 l/ha	postřik, rosení	max. 4 kg Cu/ha/rok	7-14 dnů
réva	500-1000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	4x za rok; max. 4 kg Cu/ha/rok	7-14 dnů

Dávkování vody v závislosti na růstové fázi chmele:

do BBCH 37 1000 l/ha

BBCH 37-55 1000-1500 l/ha

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,35 %, která nesmí být překročena.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
chmel, réva	50	50	50	20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

#### **4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ DALŠÍHO PROSTŘEDKU**

- rozhodnutí nebyla vydána

#### **5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)**

##### **a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku**

- rozhodnutí nebyla vydána

##### **b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského**

(nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

- rozhodnutí nebyla vydána

#### **6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)**

- rozhodnutí nebyla vydána