


Prognóza výskytu mšice makové v jarním období roku 2019
Forecast of Aphis fabae incidence for spring 2019


Nadprůměrné přelety byly nakonec během jarní sezony 2018 zaznamenány v celé republice, a nejen v Čechách, jak se původně předpokládalo. Během vegetace byla v porostech zaznamenána ve dvou vlnách. Nejdříve se lokálně vyskytovala na mladých rostlinách cukrovky a máku, a pak byly pozorovány ještě poměrně silné výskyty znovu na máku ve fázi kvetení a počátku tvorby tobolek.

Při podzimní migraci byly ovšem zaznamenány pozdní a slabě podprůměrné až průměrné přelety, jedinou výjimkou byla Lípa u Havlíčkova Brodu, kde byly pozorovány nadprůměrné počty a normální průběh migrace, i když i zde byly nejsilnější záchyty zaznamenány až na přelomu října a listopadu.


Hlavně díky pozdním přeletům je nakladeno malé množství vajíček, vejcorodé samičky měly totiž málo času na svůj vývoj a mnohdy jej nestačily dokončit před příchodem mrazů, proto pouze v **Lípě, je pro jaro 2019 předpokládáno zvýšené riziko nadprůměrných přeletů**. Na ostatním území je **očekáván pouze průměrný výskyt**, a to i za vhodných povětrnostních podmínek na jaře.



Legenda (intenzita podzimního přeletu)
Legend (intensity of autumn migration)

 **podprůměrná**
below the average

 **průměrná**
average

 **nadprůměrná**
above the average

 **kalamitní**
calamitous