

ÚKZÚZ - OOS

RNQP – výtah požadavků

Pícniny

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Další opatření pro některé druhy rostlin

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů provádějí následující doplňkové prohlídky, případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto případech:

- 1) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo *Medicago sativa* L., za účelem zamezení výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* a zajištění následujících skutečností:
 - a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, nebo
 - b) porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh *Medicago sativa* L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* na žádném sousedním předchozím porostu *Medicago sativa* L., nebo
 - c) porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti;
- 2) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo porostu *Medicago sativa* L. za účelem zamezení výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* a zajištění toho, že:
 - a) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci*, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce; nebo
 - b) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu *Ditylenchus dipsaci* a výskyt organismu *Ditylenchus dipsaci* nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo
 - c) osivo bylo podrobena vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu *Ditylenchus dipsaci* a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

Obiloviny

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m ² zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m ² zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.	Certifikované osivo první generace (C1): Nejvýše čtyři rostliny s příznaky napadení na 200 m ² zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu. Certifikované osivo druhé generace (C2): Nejvýše osm rostlin s příznaky napadení na 200 m ² zjištěných při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

RNŠO týkající se osiva obilovin

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Houby

<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Prakticky prosté	Prakticky prosté	Prakticky prosté
---	------------------------	------------------	------------------	------------------

Další opatření pro osivo *Oryza sativa* L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky, případně provede jiné kroky, aby bylo zajištěno, že osivo *Oryza sativa* L. splňuje jeden z následujících požadavků:

- a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Aphelenchoides besseyi*;
- b) bylo úředně testováno příslušnými orgány s použitím vhodných nematologických testů na reprezentativním vzorku z každé partie a bylo shledáno prostým organismu *Aphelenchoides besseyi*;
- c) bylo podrobena vhodnému ošetření horkou vodou či jiným vhodným ošetřením proti organismu *Aphelenchoides besseyi*.

Zelenina – osivo

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselého extrakce či obdobnou metodou a b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> , nebo ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> nebo iii) osivo bylo podrobena úřednímu testování na organismus <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>nebo</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo sledováno prostým organismu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo sledováno prostým organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>nebo</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>c) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a</p> <p>b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>nebo</p> <p>c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) osivo bylo podrobena úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Bruchus pisorum</i> (L.).
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nevhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a b) osivo bylo shledáno prostým organismu <i>Bruchus rufimanus</i> L.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nebo b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nebo c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Opatření
Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a: b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Sadba brambor

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> ; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i>)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> a <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i></p> <p>b) V případě všech kategorií:</p> <p>byly pěstované rostliny podrobeny úřední přehlídce porostu ze strany příslušných orgánů.</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p> <p>b) V případě všech kategorií:</p> <p>i) rostliny byly vyprodukované v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>, s ohledem na možný výskyt přenašečů</p> <p>nebo</p> <p>ii) při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na stanovišti produkce ze strany příslušných orgánů od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p>

<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:</p> <p>úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p> <p>b) V případě všech kategorií:</p> <p>i) při úředních prohlídkách partie na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p> <p>nebo</p> <p>ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškeré podnože, u nichž byly u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, aby se potvrdila nepřítomnost organismu <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p>
---	-----------------------------	--

<p>Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a: příznaky, které způsobuje: — Potato leaf roll virus</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor: materiál pochází z matečných rostlin, které jsou prosté organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y a Potato leaf roll virus; Je-li použita metoda mikrovegetativního množení, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním matečné rostliny, nebo zkouškou matečné rostliny pod úředním dohledem. Je-li použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním klonového materiálu, nebo testováním klonového materiálu pod úředním dohledem.</p> <p>b) V případě všech kategorií byly pěstované rostliny podrobeny úřední prohlídce ze strany příslušných orgánů.</p>
<p>RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují</p>	<p>Rostliny k pěstování</p>	<p>Požadavky</p>
<p>Potato spindle tuber viroid</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) V případě klonového materiálu: úřední testování nebo testování pod úředním dohledem prokázalo, že je získán z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Potato spindle tuber viroid.</p> <p>b) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor: nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid nebo u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid;</p> <p>c) V případě certifikované sadby brambor úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu.</p>
<p>RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují</p>	<p>Rostliny k pěstování</p>	<p>Požadavky</p>
<p>Příznaky virové infekce</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Při úřední prohlídce přímého potomstva nepřekračuje množství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který uvádí příloha IV.</p>
<p>RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují</p>	<p>Rostliny k pěstování</p>	<p>Požadavky</p>
<p><i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.</p>
<p><i>Ditylenchus destructor</i> Thorne</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.</p>

Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.
Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L	Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Kromě toho příslušné orgány provedou úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro základní sadbu brambor	Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro certifikovanou sadbu brambor
		PBTC	PB		
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a příznaky, které způsobuje potato leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota u přímého potomstva sadby brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota u přímého potomstva základní sadby brambor	Prahová hodnota u přímého potomstva certifikované sadby brambor
		PBTC	PB		
Příznaky virové infekce	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor		Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro základní sadbu brambor	Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro certifikovanou sadbu brambor
		PBTC	PB		
Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Prakticky prosté	Prakticky prosté	Prakticky prosté
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Vločkovitost hlíz bramboru, kterou způsobuje <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	5,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	5,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu
Prašná strupovitost bramboru, kterou způsobuje <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	3,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu	3,0 % napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu
Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry, a příznaky, které způsobuje leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

Olejníky a přadné rostliny

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů	Prahové hodnoty pro produkci základního osiva	Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – len přadný	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.

<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - len olejní	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>	15 % pro infekci <i>Phomopsis complex</i>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
<i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link [1FUSAG], vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link, vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link, vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % napadeno organismy <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> a <i>Fusarium</i> (anamorfní rod) Link vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (<i>partim</i>), <i>Helianthus annuus</i> L.	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES	Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

1) Opatření pro osivo *Helianthus annuus* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Plasmopora halstedii*

a) osivo *Helianthus annuus* L. pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Plasmopara halstedii*, nebo

b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období

nebo

c) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a

ii) příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* vykazovalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a

iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii*

nebo

- d) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během vegetačního období a
- ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a
- iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* a reprezentativní vzorek každé partie byl testován a sledán pro příznaky výskytu organismu *Plasmopara halstedii* nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
- 2) Opatření pro osivo *Helianthus annuus* L. a *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Botrytis cinerea*
- a) bylo provedeno ošetření schválené proti organismu *Botrytis cinerea* nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 3) Opatření pro osivo *Glycine max* (L.) Merrill s cílem zamezit výskytu organismu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)
- a) Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 4) Opatření pro osivo *Glycine max* (L.) Merrill s cílem zamezit výskytu organismu *Diaporthe* var. *sojae*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Diaporthe* var. *sojae* nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 5) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Alternaria linicola*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Alternaria linicola* nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 6) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Boeremia exigua* var. *linicola*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Boeremia exigua* var. *linicola* nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;
- 7) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismu *Colletotrichum lini*
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu *Colletotrichum lini* nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo
- 8) Opatření pro osivo *Linum usitatissimum* L. s cílem zamezit výskytu organismů *Fusarium* (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
- a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismům *Fusarium* (anamorfní rod), vyjma *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell nebo
- b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo.

Sadba a rozmn. materiál zelenin

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E přílohy V a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Fusarium</i> Link (anamorfní rod), vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link nebo

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>ii) porost byl vizuálně zkontrolován alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a</p> <p>b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Fusarium</i> Link.</p>
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	<p>a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk nebo</p> <p>ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byly vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a</p> <p>b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk.</p>
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.</p> <p>nebo</p> <p>b) i) — porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk nebo</p> <p>— porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk nebo</p> <p>ii) porost byl vizuálně zkontrolován ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky</p> <p>a</p> <p>b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.</p>
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	<p>a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na patogeny</p> <p>b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. a</p> <p>c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a sledány prostými příznaky výskytu organismu <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.</p>

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:</p> <p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p> <p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a</p> <p>iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.</p> <p>V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:</p> <p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev</p> <p>nebo</p> <p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;</p> <p>ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a</p> <p>iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev.</p>

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus</p> <p>nebo</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		<p>b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.</p>
Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus</p> <p>nebo</p> <p>b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a</p> <p>ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a</p> <p>iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.</p>
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo</p> <p>b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.</p>
Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	<p>a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande a <i>Thrips tabaci</i> Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a</p> <p>b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo</p>

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování	Požadavky
		ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.
Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus nebo b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Fusarium</i> Link (anamorfní rod) [1FUSAG] vyjma <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %