



ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ
OBLASTNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Korespondenční adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD

NAŠE Č. J. SRS [046502/2011](#)
VYŘIZUJE / TELEFON Jůzl/569 421 158
E-MAIL jiri.juzl@srs.cz
DATUM 26.07.2011

**Oznámení signalizace ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného
v nárazníkové zóně**

(Oblastní odbor SRS v Havlíčkově Brodě)

SRS podle § 76 odst. 1 písm. a) bodu 1. a odst. 2 písm. b) zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) nařídila Nařízením Státní rostlinolékařské správy č.j. SRS 011210/2011 z 2. února 2011, že fyzické a právnické osoby smějí pěstovat kukuřici v území vymezeném okresy Benešov, České Budějovice, Český Krumlov, Hradec Králové, Jičín, Kolín, Náchod, Nymburk, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Praha hl. m., Praha-východ, Praha-západ, Prachatice, Strakonice, Tábor a Trutnov pouze:

- a) na pozemku, na kterém nebyla kukuřice pěstována v předchozím roce, nebo
- b) v kombinaci s ošetřením proti larvám nebo dospělcům bázlivce kukuřičného insekticidním přípravkem uvedeným v platném Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin s použitím proti bázlivci nebo insekticidním přípravkem povoleným k použití proti bázlivci kukuřičnému podle § 37 odst. 2 zákona.

Ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného se provádí do dvou až tří týdnů po prvním zjištění jeho výskytu na některém z pozorovacích bodů v okruhu 40 km od pozemku, kde má být ošetření provedeno (tj. pozemku, kde byla kukuřice pěstována již minulý rok, a kde zároveň nebylo vyseto insekticidně mořené osivo nebo nebyl použit půdní insekticid proti larvám bázlivce). Pokud se na půdním bloku v okruhu 40 km od tohoto pozemku nezjistí výskyt bázlivce kukuřičného do 4. srpna, provede se ošetření proti dospělcům do 15. srpna. Insekticidní ošetření se minimálně jednou zopakuje.

Oblastní odbor SRS v Havlíčkově Brodě oznamuje první potvrzený výskyt dospělců bázlivce kukuřičného na území své působnosti ze dne 12.7.2011 v okrese Pardubice, lokalita Trnávka a ze dne 24.7.2011 v okrese Hradec Králové, lokalita Sedlice.

Přípravky povolené proti dospělcům bázlivce kukuřičného:

Název	Účinná látka	Dávkování	Ochranná lhůta
Karate se Zeon technologií 5 CS	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 – 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 – 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT nebo 28 dní (dle registranta přípravku)
Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 – 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 – 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT
Decis Mega	deltamethrin	0,2 - 0,25 l/ha (400 - 600 l/ha vody), podle signalizace, max. 1x	AT
Biscaya 240 OD	thiacloprid	0,3 l/ha (300 - 500 l/ha vody), do 65 BBCH, podle signalizace, max. 1x	30 dní
BEC Lamcy	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 - 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 - 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT
CS Lamcy	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 - 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 - 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT
KeMiChem-Lambdacyhalothrin 50 CS	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 – 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 – 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT
KeMiChem-Lambdacyhalothrin-I 50 CS	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 – 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 – 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT
RC-Lambdacyhalothrin 50 CS	lambda-cyhalothrin	0,4 l/ha (200 – 600 l/ha vody) 0,4 l/ha (40 – 80 l/ha vody při letecké aplikaci)	AT

!!! Pouze přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS je registrován k použití i do kukuřice na siláž a do kukuřice na zeleno!!!

Ing. Marie Proňková, v.r.
Vedoucí oblastního odboru Havlíčkův Brod