



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Praha 24.9.2012
čj. SRS 041085/2012

Oblastní odbor SRS
Ztracená 1099/10
161 00 Praha 6

Zpráva č. 18 oblastního odboru PRAHA o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 27.8.–23.9.2012

1. Počasí

Konec měsíce srpna byl suchý a teplý. Noční teploty dosahovaly 10 °C až 17 °C, odpolední 22 °C až 29 °C. Počátek září znamenal krátkodobý propad denních teplot až o 10 °C, po kterém následovalo opětovné postupné zvyšování teplot znovu až k 29 °C. Nárůst teplot gradoval 11. září. Druhá dekáda září již přinesla noční teploty od 4 °C do 10 °C a denní teploty od 14 °C do 24 °C. Období se vyznačovalo občasnými dešťovými srážkami různé intenzity. Lokálně se jednalo o přívalové deště. Východní část oblasti zasáhly kroupy. Srážky byly opět lokálně doprovázeny větrnými poryvy. Vál slabý proměnlivý vítr. Za celé sledované období napršelo od 1 mm do 90 mm srážek.



2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Sledované období je v oblasti již ve znamení sklizně slunečnice, končící sklizně kukuřice, dokončena je sklizeň chmele. V současnosti probíhá příprava půdy, setí ozimých ječmenů a některých odrůd ozimých pšenic. U ozimých řepok probíhá aplikace regulátorů růstu nebo fungicidů s morforegulačním účinkem. Lokálně se provádí aplikace rodenticidů. Přívalové deště způsobily lokální záplavy. Některé pozemky jsou dosud podmáčené, místy se stojící vodou.

OBILNINY

Po deštích začínají vzcházet časně seté ozimé obilniny. Pokračuje setí ozimých obilnin.

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 00-15)

(suché semeno - 5. pravý list vyvinutý)

Poslední seté plochy začínají vlivem dešťů vzcházet.

První slabé výskyty dřepčíka olejového (*Psylliodes chrysocephala*) byly pozorovány v okrese Beroun (Chyňava, 11.9.), Mělník (Všetaty, 19.9.), Příbram (Kosova Hora, 11.9.), Rakovník (Kolešovice, 11.9.).

Plošné miny způsobené vrtalkou zelnou (*Phytomyza rufipes*) pozorovány v okrese Kladno (Kačice, 13.9.).



Silný výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** zjištěn v okrese Kladno (Loucká, Miletice, 13.9.), Kolín (Třebovle, 17.9.). Střední výskyt zjištěn v okrese Kutná Hora (Radvanice nad Sázavou, Smilovice u Staňkovic, 20.9.). Na uvedených plochách proběhlo ošetření.

OKOPANINY

BRAMBOR (RF 91-99)

(hlízy ještě nemají pevnou slupku - hlízy odloučené od stonků)

Abiotické zmlazování hlíz bramboru a **abiotická sklovitost hlíz bramboru** byla zjištěna na hlízách v okrese Kladno (Vraný, 4.9.).

Všeobecný slabý výskyt **aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru (*Streptomyces scabiei*)** zjištěn v okrese Kutná Hora (Pertolice a Slavošov u Zruče nad Sázavou, Laziště u Pertolic, Volavá Lhota).

První slabé výskyty **plísňě bramboru (*Phytophthora infestans*)** na hlízách u drobných pěstitelů pozorovány v okrese Příbram (Vysoká Pec u Příbramě, 12.9.).

KUKUŘICE (RF 85-99)

(vosková zralost, zrna žlutavá až žlutá, asi 55 % sušiny zrna - sklizňová zralost, plodina sklizena)

První slabé výskyty **obecné snětivosti kukuřice (*Ustilago maydis*)** pozorovány v okrese Beroun (Chyňava, 28.9.) a Kladno (Lány, 5.9.). Opakované slabé výskyty zjištěny v okrese Nymburk (Poděbrady, Přední Lhota, Straky, 28.8.) a Rakovník (Mutějovice, Kolečovice, 6.9.).

Střední výskyt **rzivosti kukuřice (*Puccinia sorghi*)** sledován v okrese Rakovník (Mutějovice, 6.9.).

Střední výskyt **bělorůžové hníloby obilek kukuřice (*Fusarium spp.*)** pozorován v okrese Příbram (Bučovice u Březnice, 21.9.).

První výskyt 2 ks dospělců **bázlivce kukuřičného (*Diabrotica virgifera*)** v nezamořené oblasti byl laboratorně potvrzen v okrese Beroun (Chyňava, 6.9.). V oblasti nárazníkové zóny v okrese Benešov (Borovnice, 29.8.) zjištěn silný, (Vlašim, 29.8., Poříčí nad Sázavou, 29.8., Borovnice, 7.9.) zjištěn střední výskyt, v okrese Mělník (Čečelice, 4.9.), Mladá Boleslav (Plužná, 31.8.) a Nymburk (Pátek, Úmyslovice, 28.8.) byly zjištěny slabé výskyty dospělců ve feromonových lapácích. V zóně kontinuálního šíření v okrese Kolín (Křečhoř, 27.8., 11.9.) zjištěn slabý, v okrese Kutná Hora (Kobylnice nad Doubravou, 30.8., 7.9.) pak silný výskyt dospělců. Z důvodu končící sklizně kukuřic na siláž se pozorování postupně ukončuje.

Kontroly a záznamy výskytu dospělců na lepových deskách se provádí jednou týdně v období od 20.6. do poloviny října.

První slabé výskyty **zavíječe kukuřičného (*Ostrinia nubilalis*)** zjištěny v okrese Beroun (Chyňava, 28.8.).

ŘEPA CUKROVKA (RF 39-99)

(plodina úplně zapojena v porostu, listy pokrývají 90 % povrchu půdy-plodina sklizena)

První slabé výskyty **cerkosporové listové skvrnitosti řepy (*Cercospora beticola*)** zjištěny v okrese Nymburk (Pátek, 11.9.) a opakované slabé výskyty pozorovány v okrese Kutná Hora (Miskovice, 31.8., Jakub, 5.9.).

Slabé výskyty **virové žloutenky řepy (*Beet yellows virus* - BYV)** zjištěny v okrese Kutná Hora (Jakub, 29.8., Miskovice, 31.8.)



OVOCNÉ DŘEVINY

Jádroviny

JABLOŇ (RF 81-89)

(počátek zrání, vývoj odrůdově specifického zbarvení plodu - konzumní zralost, plody mají typickou chuť a optimální pevnost)

V okrese Kladno (Vinařice, 11.9.) zjištěn na plodech slabý výskyt **sazovitosti jablek (*Gloeodes pomigena*)**.

V oblasti při posledním pozorování zjištěny maximálně slabé výskyty **obaleče jablečného (*Cydia pomonella*)**. V současnosti je pozorování ve feromonových lapácích již ukončeno. Na plodech zjištěn silný výskyt v okrese Kutná Hora (Kaňk, Kutná Hora, 3.9.)

Výskyty **obaleče jabloňového (*Hedya nubiferana*)** dosahovaly v oblasti maximálně slabých hodnot. Vše odpozorováno ve feromonových lapácích. V současnosti je pozorování ukončeno. Na plodech zjištěn silný výskyt v okrese Kutná Hora (Kaňk, Kutná Hora, 3.9.).

V oblasti nebyly zjištěny výskyty **obaleče zimolezového (*Adoxophyes orana*)** ve feromonových lapácích. V současnosti je již pozorování ukončeno.

Střední výskyt poškození plodů **vosou obecnou (*Vespula vulgaris*)** pozorováno v okrese Příbram (Vysoká Pec u Příbramě, 3.9.).

HRUŠEŇ (RF 89-93)

(konzumní zralost, plody mají typickou chuť a optimální pevnost - počátek opadu listů z bází letorostů)

V okrese Kladno (Lumíkov) byl laboratorně potvrzen výskyt **fytoplazmového chřadnutí hrušně (*Candidatus Phytoplasma pyri*)** v intenzivním sadu.

Peckoviny

SLIVONĚ (RF 79-91)

(plod dosahuje asi 90 % konečné velikosti - ukončen růst letorostů, terminální pupen vyvinut, listy ještě úplně zelené)

Při posledním pozorování zjištěny v oblasti pouze slabé výskyty imag **obaleče švestkového (*Cydia funebrana*)** ve feromonových lapácích. Pozorování bylo ukončeno.

RÉVA VINNÁ (RF 89)

(sklizňová zralost)

Opakovaný slabý výskyt **plísňě révy (*Plasmopara viticola*)** na bobulích i na listech pozorován v okrese Beroun (20.9.) a Mělník (Mělník, 19.9.).

Opakovaný slabý výskyt **padlí révy (*Erysiphe necator*)** na bobulích zjištěn v okrese Mělník (Mělník, 19.9.).

Za oblastní odbor Praha zpracoval: Ing. Karel Štefan