



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Praha 31.12.2012
čj. SRS 056671/2012

Oblastní odbor SRS

Ztracená 1099/10

161 00 Praha 6

Zpráva č. 20 oblastního odboru PRAHA o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 29.10.–31.12.2012

1. Počasí

Na počátku sledovaného období klesaly noční teploty k -3°C , denní dosahovaly až k 5°C . Na začátku listopadu nastalo mírné oteplení. Po celý měsíc se teploty pohybovaly mezi 0°C až 14°C . Mírné ochlazení, kdy noční teploty klesly pod bod mrazu až k -3°C , přišlo okolo poloviny měsíce listopadu. Přibližně od počátku do poloviny prosince došlo k ochlazení. Noční teploty se vrátily pod bod mrazu. Pohybovaly se v rozpětí od -2°C do -15°C , denní od -4°C do 2°C . Nejchladnější dny období nastaly na konci první dekády prosince, kdy noční teploty klesaly až k -15°C , denní k -4°C . V druhé polovině prosince následovalo mírné oteplení, kdy se teploty pohybovaly spíše nad bodem mrazu. Oteplení kulminovalo v období vánočních svátků. Na Štědrý den padl v Dobřichovicích teplotní rekord. Teplota zde vystoupila na $13,5^{\circ}\text{C}$. Tento teplý ráz počasí se udržel až do konce sledovaného období.



Trvalejší sníh pokryl celou oblast na počátku prosince. Vydatnější sněžení dorazilo 9. prosince. Napadlo přibližně mezi 10 až 30 cm sněhu. Ve vyšších polohách a na zastíněných místech ležely zbytky sněhu několik dnů. Celkově byly srážky v uvedeném období málo intenzivní. Vydatný celodenní déšť přinesl vláhu pouze 23. prosince. V oblasti spadlo celkově za sledované období od 30 mm do 100 mm srážek. Častým jevem konce období byly inverze, mlhy a mrholení.

2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Příroda se postupně ukládala k zimnímu spánku. Jak napadl sníh a umrzlo, rozhostil se na polích klid a mír. Zdravotní stav prohlédnutých porostů před zimním spánkem byl velmi dobrý.

OBILNINY

Porosty jsou většinou dobře založené a pravidelně odnožují. Stav porostů byly pozitivně ovlivněny průběhem příznivého počasí.

PŠENICE OZIMÁ (RF 11-23 BBCH)

(fáze 1. listu: 1. list rozvinutý - třetí odnož viditelná)

V porostech podezřelých z výskytu virových zakrslostí byly v okrese Kladno odebrány tři vzorky. V jednom vzorku (Tuchlovice) byl laboratorně potvrzen výskyt virové zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus WDV).



První slabé výskyty **padlí pšenice (*Blumeria graminis*)** byly zjištěny v okresech Kladno (Vraný, 27.11., Tuchlovice, Ledce, 29.11.) a Rakovník (Kolešovice, 23.11.).

V odnožujících porostech byly na listech zjištěny ojedinělé slabé výskyty **hnědé rzivosti pšenice (*Puccinia persistens subsp. triticina*)** v okrese Kladno (Tuchlovice, 29.11.).

V okrese Kladno (Bakov, Dřínov, Jarpice), Kolín (Blinka, Dobřichov, Vrbčany, Plaňany, Zibohlavý, Žhery) a Praha-západ (Tursko) zjištěny až střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)**. Probíhalo ošetřování porostů.

Škody způsobené **prasetem divokým (*Sus scrofa*)** byly pozorovány v okrese Mladá Boleslav (Nemyslovice, Všelisy, Zamachy, 3.12.).

JEČMEN OZIMÝ (RF 21-29 BBCH)

(prvá odnož viditelná: počátek odnožování - 9 a více odnoží viditelných)

V okrese Beroun, Kladno a Příbram dochází lokálně na souvratích a v ohniscích od poloviny listopadu k fyziologickému žloutnutí listů.

V okrese Příbram (Kosova Hora, Pročevily) byly ve výdrolu ozimého ječmene podezřelého z výskytu **virových zakrslostí** odebrány dva vzorky. V obou vzorcích byl laboratorně potvrzen výskyt **virové zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus WDV)**. V okrese Rakovník byl odebrán vzorek z porostu ozimého ječmene s negativním výsledkem.

V okrese Beroun (Vráž, 31.10.) byl zjištěn první slabý výskyt **padlí ječmene (*Blumeria graminis*)** na spodních listech rostlin. V okrese Kladno (Hospozín, 27.11.) zjištěn ojedinělý opakovaný slabý výskyt.

V prvních slabých výskytech na listech v okrese Příbram (Pročevily, 20.11.) a Rakovník (Kolešovice, 23.11.) pozorována **síťovitá a okrouhlá skvrnitost ječmene (*Pyrenophora teres*)**. Opakované slabé výskyty zjištěny v okrese Kladno (Hospozín, 27.11.).

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 19)

(6 až 9 a více listů vyvinuto)

Všeobecně převládají husté, vzrostlé porosty. Lokálně se projevuje nedostatek živin fialovým zbarvením rostlin.

Na spodních listech rostlin v okrese Příbram (Kosova Hora, 9.11.) a Rakovník (Kolešovice, 2.11.) zjištěny první slabé příznaky napadení **fomovým černáním stonku řepky (*Leptosphaeria maculans*)**.

Slabé výskyty okřídlené **mšice zelné (*Brevicoryne brassicae*)** na listech zjištěny v okrese Kladno (Kmetiněves, 27.11.) a Rakovník (Kolešovice, 2.11.).

Slabý výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** zjištěn v okrese Beroun (Chyňava, 8.11.).

PASTVINY, LOUKY, TTP

TTP, Víceleté pícniny

Zjištěny lokální silné a střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** na pastvinách, loukách a ve víceletých pícninách v okrese Kladno (Dřínov, 12.11., Poštovice, 12.11., Třebíz, 30.10.).

Za oblastní odbor Praha zpracoval: Ing. Karel Štefan